

PRESENTACIÓ

En aquesta cinquena edició hem rebut una allau d'articles que van des de la Paleornitologia fins a la mitologia ornítica. Esperam que en successius anys ens segueixin enviant tantes col.laboracions; lamentablement no hem pogut incloure tots els articles que ens han remès, per sortir-se del termini previst.

*En el capítol de cites ornitològiques del '90 se citen per primera vegada a Balears quatre noves espècies d'ocells: Sel.la ala-blava (*Anas discors*) observada a S'Albufera des Grau (Menorca), titina d'esquena olivàcia (*Anthus hodgsoni*) a Formentor (Pollença), un pinçà carminat (*Carpodacus erythrinus*) anellat pel GAG-Mallorca a Sa Dragonera, així com un ibis sagrat (*Threskiornis aethiopicus*) a Artà; encara que probablement aquesta darrera observació sigui un ocell escapat de captivitat. En aquest sentit és necessari insistir en la necessitat d'un major control a les duanes per part de les autoritats competents, per a evitar l'entrada d'animals exòtics a les nostres Illes (que com se sap incideixen negativament sobre la fauna autòctona), a fi de complir les directives del Conveni de Washington sobre el Comerç Internacional d'Espècies de Flora i Fauna Amenaçades (CITES) 1975, que entrà en vigor a Espanya el 1986. Com a recordatori CITES ha prohibit el trànsit de les espècies en perill d'extinció i ha posat rigorosos controls en el comerç de moltes espècies considerades amenaçades, especialment els lloros i ocells de presa han estat els més beneficiats per aquest important conveni. De no ser així, aviat veurem a les nostres illes tot tipus d'espècies.*

*Amb la finalitat de posar-nos al dia, us comunicam que a partir d'aquest Anuari, reservarem la denominació de *Puffinus yelkouan* par a la baldritja mediterrània com a espècie distinta, amb dues races *P.y. mauritanicus* i *P. y. yelkouan*, a la vista de les seves diferències amb *Puffinus puffinus* en estructura, distribució i reproducció més primerenca seguida d'una migració cap al nord (Bourne et al. 1988, *Brit. Birds* 81: 306-319), la qual cosa ha estat objecte de discussió durant anys sobre si en realitat lo que venien considerant fins fa poc una mateixa espècie *Puffinus puffinus*, dividida en tres subespècies (*P.p. puffinus*, *P.p. mauritanicus* i *P.p. yelkouan*) que se distribueixen per Europa, pot dividir-se en dues espècies noves, una que cria a l'Atlàntic i l'altra en el Mediterrani. Per les raons exposades i per evitar confusions amb altres denominacions que s'han usat, se suggereix reservar el nom de *Puffinus yelkouan* per la baldritja mediterrània, que compta amb dues subespècies, la baldritja gran, generalment amb el gavatx més obscur coneguda com a baldritja baleàrica (*P.y. mauretanicus*) que cria exclusivament a Balears i hiverna a les costes occidentals d'Europa i Àfrica; i la baldritja petita de gavatx blanquinós anomenada baldritja de llevant (*P.y. yelkouan*) que cria en el Mediterrani central i oriental i hiverna al Mar Negre i no s'ha comprovat mai que visiti l'Atlàntic. Com a curiositat el nom científic de *yelkouan* és també el nom local com es coneix aquesta baldritja a Turquia.*