

DUES ESPÈCIES DE NOCTUIDAE (LEPIDOPTERA) INÈDITES PER A LA FAUNA BALEAR

E. PETITPIERRE⁽¹⁾

PARAULES CLAU: *Mormo maura*, *Catephia alchemysta*, *Noctuidae*, Lepidòpters, Balears.

KEYWORDS: *Mormo maura*, *Catephia alchemysta*, *Noctuidae*, Balearic Islands, Lepidòptera.

RESUM. S'indica per primera vegada la presència de *Mormo maura* L. i de *Catephia alchemysta* D. et S. com a integrants de la fauna balear de *Noctuidae* a Mallorca.

SUMMARY. TWO NEW SPECIES OF NOCTUIDAE IN THE BALEARIC ISLANDS. Two species of *Noctuidae* moths, *Mormo maura* L. and *Catephia alchemysta* D. et S., are recorded for the first time for the Balearic Islands (Majorca)

Recentment, CUELLO (1981) ha publicat un cens provisional dels lepidòpters balears en el qual s'esmenten 373 espècies. També es destaca la pobresa de dades referides a les espècies nocturnes (*Heterocerca*) en relació al que hom esperaria respecte a àrees continentals properes. Aquestes llacunes en el coneixement dels *Lepidoptera* insulars s'han fet paleses, i en part s'han

⁽¹⁾ Laboratori de Genètica. Dept. Biologia i C. S. Facultat de Ciències. Univ. Illes Balears. 07071-Palma de Mallorca.

reduït, en dues publicacions posteriors que han afegit més de trenta espècies noves per a l'arxipèlag balear, tant de *Noctuidae* (CUELLO *et al.*, 1984) com de *Geometridae* (VALLHONRAT & PETITPIERRE, 1985). Des d'aleshores, encara que la meua tasca entmològica sobre els lepidòpters hagi estat molt esporàdica, he capturat varies papallones desconegudes fins ara a la fauna balear, com les indicades a continuació:

Mormo maura L.- Esporles (Mallorca), 21-VI-1988, 1 ex. ♀ .

Catephia alchemysta D. et S.- Esporles (Mallorca), 28-VI-1984, 1 ex. ♂ , i 6-VIII-1984, 1 ex. ♀ .

Ambdues pertanyen a la família *Noctuidae*, però a subfamílies distintes.

La primera figura entre els noctúids ibèrics més grans, per la qual cosa resulta curiós que hagi passat desapercebuda a Mallorca. Això s'explica probablement per la seva raresa, en trobar-se les Balears al límit de la seva distribució meridional. GÓMEZ-BUSTILLO *et al.*, (1979) l'hi atribueixen una corologia supramediterrània-asiàtica.

La segona té una distribució general similar a la de l'anterior (GÓMEZ-BUSTILLO *et al.*, 1979), i tampoc pareix freqüent a Mallorca.

Convendria recopilar altres dades geogràfiques sobre la distribució d'ambdues espècies a la Serra de Tramuntana mallorquina i, potser, també a altres indrets; tot i que resultaria sorprenent detectar-les fora de les zones més humides de Mallorca.

BIBLIOGRAFÍA

- CUELLO, J. 1981.- Els lepidòpters de les Illes Balears. Cens provisional. *Treb. Soc. Cat. Lep.*, 4: 33-54.
- CUELLO, J.; MASÓ, A.; PÉREZ DE GREGORIA, J.J.P. & PETITPIERRE, E. 1983.- Noc-túids (Insecta, Lepidoptera) nous o interessants per a la fauna de les Illes Gimmèsie. *Boll. Soc. Hist. Nat. Balears*, 27: 33-38.
- GOMEZ-BUSTILLO, M.R.; ARROYO VARELA, M. & YELA GARCIA, J.L. 1979.- *Mariposas de la Península Ibérica, Heteróceros III*. Publ. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- VALLHONRAT, F. & PETITPIERRE, E. 1985.- Contribució a la fauna de geomètrids de les Balears. *Treb. Soc. Cat. Lep.*, 7: 39-42.