

L'Observatori



De Març a Maig a garrigues i camps de conreu


Els mesos en els quals entrem, de març a maig, suposen un canvi important per l'avifauna que podem observar. A les garrigues i als camps de conreu, on trobarem principalment passeriformes, hi podrem veure encara els darrers hivernants, observarem gairebé sencera la migració pre-nupcial i gaudirem d'espècies nidificants, tant sedentàries com estivals, que es troben en plena activitat.

Les observacions d'espècies hivernants s'allarguen fins a començaments d'abril, encara que en la majoria de casos deixarem de veure-les el mes de març. Així, podrem veure encara algunes terroles (*Alauda arvensis*), titines sordes (*Anthus pratensis*), xàtxeros blancs (*Motacilla alba*), alguns amb el plomatge d'estiu des de finals de febrer, ropits (*Erithacus rubecula*), coa-roges de barraca (*Phoenicurus ochruros*), tords (*Turdus philomelos*) o ulls de bou (*Phylloscopus collybita*).



A mesura que passin les setmanes podrem gaudir de les espècies migrants i estivals, que fan augmentar de manera important la diversitat. Des del mes de març podrem veure les primeres falzies (*Apus apus*), oronelles (*Hirundo rustica*) i cabots (*Delichon urbica*) alimentant-se sobrevolant els camps. Des de finals de mes veurem ja algunes verolles (*Anthus campestris*), coa-roges (*Phoenicurus phoenicurus*),

primaveres (*Oenanthe oenanthe*) i ulls de bou grossos (*Phylloscopus trochilus*). A mesura que entrem en el mes d'abril arriben les primeres tórteres (*Streptopelia turtur*), terrolots (*Calandrella brachydactyla*), rossinyols (*Luscinia megarhynchos*), cagamànecs (*Saxicola rubetra*), matamosques (*Muscicapa striata*), matamosques negres (*Ficedula hypoleuca*) i capsigranys (*Lanius senator*). Més tard, cap al mes de maig, quan la passa d'aucells en migració comença a finalitzar, es detecten els primers enganapastors (*Caprimulgus europaeus*), cantant de nit.



Dins aquests mesos podrem gaudir també de la reproducció de la majoria d'espècies. Algunes ja canten des de

l'hivern, com el puput (*Upupa epops*), la cucullada (*Galerida theklae*), la butxaqueta (*Cisticola juncidis*), el gafarró (*Serinus serinus*) o la sól·lera (*Miliaria calandra*), mentre que altres inicien els cants els mesos de març, abril o fins i tot el maig. Així, sentirem des del març la tórtera turca (*Streptopelia decaocto*), el llenguerut (*Jynx torquilla*), el vitrac (*Saxicola torquata*), la mèl·lera (*Turdus merula*), el xòrrec (*Sylvia sarda*) i diverses espècies de fringíl·lids. Encara més tard, cap a començaments de maig, podrem sentir el cant de les guàtleres (*Coturnix coturnix*) o el refilar melodiós dels rossinyols (*Luscinia megarhynchos*), sobretot de nit..

Des de mitjan mes d'abril la nidificació es troba en el seu punt culminant, quan moltes espècies han posat els ous i algunes ja tenen polls, o fins i tot ja han volat. Aleshores, a més de les espècies esmentades, són moltes les que traginen amunt i avall cap als nius, com la perdiu (*Alectoris rufa*), el sebellí (*Burhinus oedicnemus*), l'òliba (*Tyto alba*), el mussol (*Otus scops*), la vistosa sól·lera boscana (*Emberiza cirulus*)...

Joan Riera