



Es Busqueret es queixa

Les aus asilvestrades, una amenaça recent

Aquesta darrera dècada, un nou fenomen ha començat a afectar la nostra avifauna d'una manera incipient. Es tracta de la presència, cada vegada més habitual, d'aus exòtiques que conviuen amb la fauna autòctona a la nostra illa. La generalització del costum d'importar aquestes aus com a animals de companyia o "decoració" ha estat prou important aquests darrers anys. Així, a



la tradicional presència a parcs i pseudo-zoològica s'hi ha d'afegir l'extensió d'aquest fenomen a moltes col·leccions particulars, sovint fora de tot control. La diversitat d'espècies sotmeses a aquesta pràctica és espectacular; des dels tradicionals lloros i cotorres (psittàcids) fins a rapinyaires i aus aquàtiques, sobretot anàtides,

passant per tot tipus de passeriformes.

Els problemes d'aquesta pràctica en les poblacions salvatges de les espècies afectades són ben coneguts; captures indiscriminades, mort de molts d'exemplars durant el viatge, etc. Per aquest motiu, el comerç d'animals salvatges està regulat a nivell internacional. Tot i així, es pensa que el tràfic il·legal d'espècies suposa el tercer negoci més important a nivell mundial dins la categoria dels il·legals, després del tràfic d'armes i de drogues.

Als territoris receptors, els problemes es generen quan aquestes espècies s'escapen o són alliberades i aconsegueixen formar poblacions estables. Llavors, els problemes poden ser diversos:

Hibridació amb espècies autòctones. El cas que ha resultat més preocupant fins ara és el de l'ànnera de jamaica (*Oxyura jamaicensis*), que fou introduïda a Anglaterra fa anys. Aquesta espècie ha arribat a posar en perill l'ànnera carablanca (*Oxyura leucocephala*), amb la qual hibrida.



ànnera carablanca

mascle



ànnera de jamaica

mascle

Aquests casos d'hibridació també es poden donar entre aus salvatges i aus domèstiques d'una mateixa espècie, provocant problemes de pèrdua de puresa en alguns casos, com en els cap-blaus (*Anas platyrhynchos*) i les ànneres grisetes (*Anas strepera*).

Molèsties sobre les espècies autòctones. L'establiment de poblacions de noves espècies pot provocar greus trastorns a les

espècies autòctones. Així, la competició pels mateixos recursos tròfics (aliment) o les molèsties durant el període de nidificació poden esdevenir greus problemes. A Mallorca tenim un cas paradigmàtic d'aquest segon aspecte; durant els anys 70', tres voltors asiàtics, de de l'auto-safari de Sa Coma interferiren de manera important en la nidificació del voltor (*Aegypius monachus*), aleshores en greu perill de d'extinció.

Problemes per a l'ornitologia com a ciència. De cada vegada es fa més complicat determinar si algunes observacions d'espècies considerades accidentals a les nostres illes corresponen a aus asilvestrades o a aus que han arribat de manera natural. Així, han esdevingut casos de difícil interpretació, sobretot amb espècies presents al continent africà que poden presentar-se de manera accidental al nostre territori. Un bon exemple d'això n'és l'ànnera canyella (*Tadorna ferruginea*), observada diversos cops els darrers anys sense poder-ne determinar la procedència.

Davant tot això la nostra postura ha de ser ben clara; rebutjar la tinença en captivitat d'espècies exòtiques i reclamar a l'administració que les que arribin aquí siguin controlades (i identificades) correctament, prenent totes les mesures necessàries per evitar la seva fuga i establiment de poblacions en el medi natural.

Joan Riera

