

OBSERVACIONS D'AUS MARINES DES DE PUNTS ESTRATÈGICS DE LA COSTA MALLORQUINA

Maties Rebassa

Tot i que les aus marines són uns dels més grans valors ornitològics amb els que comptam a Mallorca, encara manquen per conèixer molts detalls sobre la seva distribució i sobre l'ús que en fan de la costa quan es desplacen o s'alimenten. Sobre aquest darrer punt en particular s'ha estat treballant durant aquest darrer any, gràcies a l'esforç d'ornitòlegs voluntaris i a una beca del GOB. Per a l'estudi de les aus s'han elegit una sèrie de punts estratègicament situats (Cap de Formentor, Cap de Capdepera, Porto Colom, Cap de Ses Salines, Cap Blanc, Cap Enderrocat, Cala Figuera de Calvià, i Cap Gros de Muleta -Sóller) des d'on poder observar amb comoditat els moviments de les aus marines.

Dues-centes quatre hores d'observació

metòdica i sistemàtica han donat com a fruit 33.284 observacions de 18 espècies. Podem veure a la taula com la gran majoria d'aus observades corresponen a tan sols tres espècies, la gavina vulgar (*Larus cachinnans*), amb un 63% del total d'observacions, la baldritja balear (*Puffinus mauretanicus*) amb quasi un 19%, i el virot (*Calonectris diomedea*) amb quasi un 13%.

Això no obstant, també hi ha hagut temps per a fer observacions d'espècies molt menys freqüents, com la gavineta de tres dits (*Rissa tridactyla*) i el cadafet (*Fratercula arctica*), espècies aquestes que generalment no es deixen veure si no és des d'una barca i lluny de la costa, o d'altres també escasses com el pingdai (*Alca torda*), la baldritja mediterrània (*Puffinus yel-*

Punts d'observació



Espècie	Nombre d'aus	Percentatge (%) sobre total
<i>Podiceps nigricollis</i>	1	0,003
<i>Calonectris diomedea</i>	4.249	12,766
<i>Puffinus mauretanicus</i>	6.295	18,913
<i>Puffinus yelkouan</i>	6	0,018
<i>Morus bassanus</i>	159	0,478
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	937	2,815
<i>Phalacrocorax carbo</i>	40	0,120
<i>Melanitta nigra</i>	1	0,003
<i>Stercorarius skua</i>	5	0,015
<i>Larus cachinnans</i>	20.990	63,063
<i>Larus fuscus</i>	8	0,024
<i>Larus audouinii</i>	503	1,511
<i>Larus ridibundus</i>	29	0,087
<i>Rissa tridactyla</i>	4	0,012
<i>Sterna sandvicensis</i>	47	0,141
<i>Chlidonias hybrida</i>	5	0,015
<i>Alca torda</i>	1	0,003
<i>Fratercula arctica</i>	4	0,012
TOTAL	33.284	100

Exemplars i percentatges de cada espècie observada

kouan), la negreta (*Melanitta nigra*), etc. Si dividim l'any en períodes de tres mesos, resulta que han estat l'hivern (desembre a febrer) i la primavera (març a maig) les temporades en que s'han vist més espècies diferents (14 a cada una d'elles), mentre que a l'estiu (juny a agost) només se n'han vistes 5, i 10 a la tardor (setembre a novembre).

També ha estat a l'hivern quan més aus s'han detectat: una mitjana de 197 aus cada hora, per només 108 aus/hora (quasi la meitat) a l'estiu.

És interessant destacar que tant la baldrinça com el virot han estat molt obser-

vats just abans de començar amb les postes dels ous, però en canvi després han estat molt menys vistos, indicatiu clar de que a partir d'aquelles dates els adults no es desplacen amb tanta freqüència per devers la costa mallorquina, i que amb molta probabilitat se'n van a pescar a aigües més llunyanes i productives.

També molt interessant ha estat la notable presència de sotelers (*Morus bassanus*) entre els mesos de novembre i febrer, especialment als observatoris més propers a les Illes Pitiüses. Quasi totes les aus observades han estat adultes (un 90%), mentre que les aus juvenils o subadultes han estat molt escasses.