



Els nostres aucells

Els virots

Pere Vicens ¹

El virot gros *Calonectris diomedea*, el virot petit *Puffinus mauretanicus* i el virot de llevant *Puffinus yelkouan* són tres aus que ens poden dur a confusió, sobretot si no estem averseuats a observar les espècies marines. Semblen gavines joves però les podem diferenciar d'aquestes per:

- Tenen costums molt més pelàgiques (viuen a mar endins) i sols s'acosten a la costa en les migracions i per a criar.
- Solament el virot gros és de la grandària d'una gavina. Els altres dos són notablement més petits d'envergadura.
- La manera de volar dels tres és planejar a ran d'aigua, mentre que les gavines habitualment volen més alt amb batecs d'ala generosos.
- La coloració és gris terrosa general, sense les escates habituals a les edats joves de les gavines.

Entre ells, també hi ha diferències substancials que ens permetran diferenciar-los, sobretot quan es veuen al mateix temps. Ens fixarem primer en la grandària i en la manera de volar:

- El virot gros és (com indica el nom) més gros i més lent, amb moviments dolços i llargues planejades amb unes batudes d'ales suaus.

- Els altres dos són més petits, amb les batudes d'ales més ràpides, poc elegants, i les planejades són més curtes.

La coloració és també diferent:

- El virot gros té les parts superiors de color gris-terra amb les puntes de les ales i de la cua negres (aquest és un detall molt important). Les parts inferiors són blanques.
- El virot petit té les parts superiors molt més fosques, amb el capell una mica més fosc (detall també important). Les parts inferiors són de color crema amb una suau transició cap al color fosc de la cara. La línia fosca de les aixelles (la vorera de les plomes axil·lars i les infracobertores petites) és difosa.
- El virot de llevant és molt semblant al virot petit, però té un major contrast entre les parts superiors, quasi negres, amb les inferiors, quasi ben blanques, sobretot a la zona del coll. La línia fosca de la zona de les aixelles es pot veure clarament.

De tota manera, diferenciar el virot petit i el virot de llevant és difícil i complicat per les variacions de coloració de cada una de les dues espècies, que poden arribar a semblar-se molt. Cal recordar també que el virot gros és abundant arreu de les


(¹) perevicens@ono.com

Illes mentre que el virot petit és molt més abundant a les Pitiüses i que el

virot de llevant és un escàs visitant a l'hivern i a les migracions.

Virots petits

Puffinus mauretanicus



Virots de llevant

Puffinus yelkouan



Virots grans

Calonectris diomedea

