

Més que aucells

Els odonats

Per Xavier Canyelles

El grup dels odonats agrupa libèl·lules i cavallets del dimoni. Són insectes amants del sol i de llocs humits. L'estiu és ideal per

observar-los i gaudir de la seva estilitzada i aerodinàmica bellesa. Després d'haver passat un any, a vegades més, dins l'aigua en estat juvenil o ninfal, els adults emergeixen aquests dies i desenvolupen una màxima activitat concentrada en reproduir-se, defensar el

territori i capturar les seves preses. Algunes espècies són migradores.

En general, la identificació no és gaire difícil. Ara veurem les principals espècies que podem trobar a les Balears:

1. *Anax parthenope*, 2. *Aeshna mixta*, 3. *Anax imperator* ♂, 4. *Orthetrum caeruleum* ♂, 5. *Crocothemis erythraea* ♂, 6. *Sympetrum fonscolombii* ♂, 7. *Sympetrum striolatum* ♂, 8. *Sympetrum fuscum*, 9. *Ishura elegans* ♂, 10. *Aeshna isoscelis*, 11. *Leestes viridis*, 12. *Orthetrum cancellatum* ♂, 13. *Ceragrion tenellum* ♂, 14. *Calopteryx haemorrhoidalis* ♂, 15. *Orthetrum cancellatum* ♀



Identificació

Les tórtores

Streptopelia decaocto i *Streptopelia turtur*

Per Cristina Fiol

A les Balears nidifiquen dues espècies de tórtores aparentment senzilles d'identificar, però, pel fet que moltes vegades es veuen en vol fugaç, val la pena remarcar les seves diferències.

La tórtora *Streptopelia turtur*

Aquesta tórtora és una espècie estival reproductora a les Balears, fet que ens dona una pista a l'hora de diferenciar-la de l'anterior, ja que només tendrem dubtes quan coincideixen durant els darrers mesos de primavera i a l'estiu.

És més habitual observar-la en zones de cultius i boscos no gaire tancats.

És molt més "pintada" que l'anterior, sobretot els mascles. Destaca sobretot la coloració d'una part de les plomes cobertores, d'un to marró ataronjat en els adults amb el centre de la ploma negra que li dona l'aparença d'estar escamada. La coloració general és més grisa, però clara al ventre i amb el pit rosat, més accentuat en els mascles. A la cua també destaca la franja blanca però amb la part superior de les rectrius negres, i mostra així un patró diferenciat de la tórtora turca. Per acabar, hem de dir que no presenta collar com la seva parenta sinó 3 o 4 retxes negres dins fons blanc als costats del coll.



La tórtora turca *Streptopelia decaocto*

Aquesta espècie ha esdevingut en pocs anys una habitual dels parcs, jardins i zones periurbanes en general i sembla que no s'allunya gaire de les zones humanitzades. És present a Balears durant tot l'any.



Presenta una coloració bastant homogènia. El cos és color gris-ant, amb el mantell, una part de les plomes cobertores alars i el carpó de tonalitats més marronoses, però molt tènues. Les primàries i part de les secundàries són de color gris fosc, en alguns casos quasi negres i delimitades per la part superior de l'ala, d'un color més clar. A la cua s'observen dues franges horitzontals clares a les rectrius externes. Això darrer, junt amb el semicollar negre emmarcat en blanc, són trets diferenciadors de la tórtora turca davant de la tórtora.