


Cegalls de mosson



Cegall de mosson

Llargària: 37-42 cm.

Envergadura: 63-74 cm.



Cegall de mosson coabarrat

Llargària: 33-41 cm.

Envergadura: 62-72 cm.

Tant en el cegall de mosson (*Limosa limosa*), com el cegall de mosson coabarrat (*Limosa lapponica*) es poden veure a les illes Balears durant la migració o a l'hivern, si bé tots dos són escassos o rars. Es troben en el grup dels limícoles més grans que visiten les nostres zones humides.

El cegall de mosson nidifica des del centre a l'est d'Europa, estenent la seva àrea de reproducció fins a la Xina. El cegall de mosson coabarrat cria molt més al nord, pels països escandinaus i Rússia -d'aquí li ve el seu nom agafat de la Lapònia- així com a les costes d'Alaska. És un extraordinari migrador que ostenta el rècord de vol sense aturada conegut per a un aucell, 11.000 kilòmetres en 9 dies sense aturar !!

La seva diferenciació és relativament fàcil en vol ja que el cegall de mosson posseeix tres trets distintius: una molt evident franja alar blanca, la part terminal de la coa negra i que les potes li sobresurten molt per darrera de la coa, mentre que el cegall de mosson coabarrat no té franja alar, presenta la coa amb un barrat blanc i negre. I els peus pràcticament no li surten per darrera la coa.

Però quant estan posats podem tenir problemes per diferenciar-los. El tret més característic del cegall de mosson són el bec més llarg i recte, amb la base de color taronja, la coa negra i les potes molt més llargues, si bé aquest darrer aspecte pot ser més difícil d'aplicar si no veiem als exemplars de les dues espècies junts i també quedarà inservible si

l'exemplar es troba dintre de l'aigua. A l'hivern és de color gris uniforme amb el dors llis i en plomatge estival mostra els flancs i la pitiera marcadament barrats de negre. El cegall de mosson coabarrat presenta el bec més curt i marcadament incurvat (corbat cap a dalt), la coa barrada i les potes bastant més curtes. A l'hivern el dors és marcadament escamat i a l'estiu no mostra franges negres als costats.

Els cegalls de mosson es poden veure a qualsevol de les zones humides de les Balears, però, principalment, a les salines. •