

Identificació

Per **Manolo Suárez**
Dibuixos de **Miquel Morlà**

A les Illes Balears podem observar 3 espècies de voltors: el voltor negre (*Aegypius monachus*), el voltor lleonat (*Gyps fulvus*) i la miloca o moixeta voltonera (*Neophron percnopterus*).

Avui tractarem els dos primers, més grans, i que són els que es poden confondre quan volen. La miloca, més petita tot i que és d'una mida considerable, combina els colors blanc i negre, molt diferent dels altres dos, i al vol és més fàcil que es pugui confondre, per exemple, amb un esparver (*Hieraaetus pennatus*) de fase clara, o fins i tot amb una cigonya (*Ciconia ciconia*), que no amb els altres voltors.

El voltor negre i el lleonat són enormes, de fet el negre es considera l'au de major envergadura

d'Europa, amb quasi 3 metres de punta a punta d'ala, i el lleonat no es queda gens darrere.

Els dos nidifiquen a la Serra de Tramuntana de Mallorca i apareixen també, de tant en

tant, per les altres illes. La població de voltor negre que nidifica a Mallorca és l'única insular que queda al món. El voltor lleonat és un "nouvingut": un grup va arribar el 2008, després d'una forta tempesta de vent, i va començar

a criar el 2012. Ara hi ha unes 15 parelles de voltor lleonat i unes 35 de voltor negre.

Com el seu nom indica el voltor negre té tot el cos molt fosc, però va perdent color a mesura que passen els anys, i els exemplars vells són més marrons que negres. El cap dels joves també és ben negre, mentre que als adults, a poc a poc, els hi torna més clar (sembla que li surtin cabells blancs). Quan vola les ales es veuen ben rectangulars i ben planes en relació al cos, com si fossin dos taulons.

El voltor lleonat és un poc més petit que el negre però d'envergadura semblant. Es veu més clar en coloració, amb un contrast entre les plomes de vol, fosques, i la resta de l'ala. El coll i el cap són blancs i donen la sensació d'estar més estirats. Quan planeja la silueta no és tan angulara com la del negre i les ales tenen certa forma de S. A més a més, les ales no se situen paral·leles al cos, com en el cas del voltor negre, sinó que formen un angle que fa que adopti una forma de V.

In memoriam

Dedicat a l'amic Juan José Sánchez Artés, que ens deixà el 13 de novembre de l'any passat, després d'haver dedicat molts d'anys de la seva vida a la conservació dels voltors.



A les dues espècies el cap té unes plomes molt curtes (perquè sovint el fiquen dins els animals morts, i eviten així que s'embrutin) i la coa és també bastant curta en comparació amb les grans

àguiles. És fàcil que volin junts a la recerca de menjar i que igualment comparteixin la caronya si aquesta és abundant.



voltor negre



voltor lleonat

Voltors