



Mascarell bru, *Sula leucogaster*. Foto: Fernando de Noronha / Wikimedia

Mascarell bru *Sula leucogaster*

Per Steve Nicoll

Seguint amb la nostra nova secció "Fora de Ruta", toca aquesta vegada una de les espècies, tal vegada més "tropical" que han visitat les nostres illes: el mascarell bru, *Sula leucogaster*.

El dia 11 de novembre de 2019, el nostre company ornitòleg Juanjo Bazán, mentre observava aus marines des de Canyamel (Capdepera), va poder fotografiar de lluny, el que en un

primer moment li va semblar un soteler, *Morus bassana*, jove, una espècie hivernant bastant regular. Quan va mirar la pantalla de la càmera, es va adonar amb sorpresa que es tractava d'una altra espècie, mai citada fins aquell moment a la Mediterrània, un exemplar que clarament va poder identificar com un mascarell bru, *Sula leucogaster*.

Curiosament, el dia 20 de juny de

2020, Toni Escandell va poder observar i filmar un soteler a aigües del Parc Nacional de Cabrera. Una setmana després, personal de l'IMEDEA va tenir una altra trobada, a la mateixa zona, amb un exemplar que en Manolo Igual va identificar com a mascarell bru i després, revisant les imatges d'en Toni Escandell, es va poder veure que el que havien vist i filmat uns dies abans era també el



Mascarell bru *Sula leucogaster*. P.N. de Cabrera, Mallorca. 20/06/2020. Vídeo: Paleàrtica Films, Toni Escandell.



Mascarell bru *Sula leucogaster*. Canyamel, Capdepera, Mallorca. 11/11/2019. Foto: Juanjo Bazán.

mascarell bru. A causa de l'escassetat de cites d'aquesta espècie, no es pot descartar que aquest exemplar fos el mateix que va observar en Juanjo set mesos abans, possiblement acostumat ja i a gust, a les Balears.

Aquesta au marina és la més petita de la família Sulidae, que inclou el soteler que podem veure cada hivern. És de fàcil identificació, amb les parts superiors de color marró fosc, a l'igual que el cap i el pit. S'observa un fort contrast amb les parts inferiors blanques. Pot arribar a una envergadura alar d'1,50 m. És bastant gregari i nia a colònies. S'alimenta generalment en grup, tot i que de vegades se'l veu solitari, i sovint associat a altres aus marines o cetacis. Comparteix el costum del soteler de pescar llançant-se com una fletxa amb les ales plegades des de certa altura.

Les cites d'aquesta espècie a Europa són escasses, tot i que sembla que als darrers anys han anat en augment, possiblement com a resposta a l'escalfament del mar pel canvi climàtic. Sols al 2019 hi va haver 4 cites al Regne Unit (de 5 cites històriques reals) i una primera cita a França. Espanya compta amb una mitja dotzena de cites, distribuïdes des d'Andalusia fins a Galícia, però fins ara cap dins el Mediterrani.

Té una àmplia distribució pels mars tropicals de tot el món i compta amb quatre subespècies. La varietat *leucogaster* nidifica al Carib, al Golf de Mèxic i a diferents illes de l'Atlàntic, on arriba cap al nord fins a l'arxipèlag de Cap Verd (allà s'estimen al manco 1.000 parelles reproductores). Es tracta d'una espècie resident, però amb dispersions, principalment individus juvenils. •



Distribució mundial del mascarell bru *Sula leucogaster*. Font: BirdLife International (2020) IUCN Red List for birds