

Per **Maite Serra-Franco**

El darrer incendi a s'Albufera de Mallorca se suma a les altres greus amenaces que afecten el Parc

El darrer incendi sofert al Parc Natural el passat mes de setembre i que va cremar 438 ha va afectar principalment la vegetació de canyet *Phragmites australis*, una vegetació que tot i recuperar-se molt ràpidament, depèn de la presència d'aigua dolça. Aquest element que als darrers anys no arriba de manera mínimament òptima a l'espai protegit, resulta crucial per a la conservació de la biodiversitat del Parc Natural.

L'excessiva demanda d'aigua destinada a la plana agrícola de sa Pobla i Muro i

als requeriments turístics i hotelers de la badia d'Alcúdia, provoca, des de fa anys, una sobreexplotació dels aqüífers d'aigua dolça que abasteixen el parc. Aquest fet afavoreix la filtració d'aigua marina provocant la greu i progressiva salinització de les aigües de s'Albufera.

Com a conseqüència, el darrer incendi no ha fet més que agreujar la cada vegada més reduïda extensió de canyet, ja afectat per l'elevada salinitat de l'aigua a certs indrets i que limita la seva extensió. També les poblacions

de petits invertebrats i ocells lligats a la presència d'aquest tipus de vegetació poden veure minvades les possibilitats de sobreviure, per manca de refugi i aliment adequat i corren el risc de desaparèixer per la pèrdua dràstica d'aquest tipus d'hàbitat preferent i en regressió a tot el continent. El canyet és fonamental per a diversos ocells protegits, com l'hortolà de canyet *Emberiza schoeniclus whitebyi*, l'agró roig *Ardea purpurea* o la boscarla mostatxada *Acrocephalus melanopogon*.



Conselleria de Medi Ambient i Territori

El Parc Natural de s'Albufera de Mallorca allibera 44 exemplars de rosseta

El tècnics del Servei de Protecció d'Espècies i del Parc Natural de s'Albufera han alliberat enguany 44 exemplars de rosseta *Marmaronetta angustirostris*. Aquesta petita ànnera és considerada en perill crític d'extinció a l'àmbit estatal. Els exemplars amollats han nascut en captivitat al zoo de Colònia, Alemanya i s'han alliberat seguint les directrius del Pla Homeyer, que cerca la recuperació d'espècies aquàtiques i que s'executa a Balears des de 2008.

El nombre de flamencs al Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera aconsegueix xifres rècord

Durant el passat mes de setembre de 2020, l'equip tècnic del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera ha comptabilitzat fins a 1.015 exemplars de flamencs presents al parc. Aquest cens ha aportat les xifres més elevades des que es varen començar a registrar les poblacions d'aquest ocell a l'espai natural protegit, el 1988.



Flamencs, *Phoenicopterus roseus*. Maite Serra-Franco.



Milana, *Milvus milvus*. Cati Artigues.

Resultats el cens de milanes als dormidors d'hivern de Mallorca

El darrer cens de milanes, *Milvus milvus* als dormidors d'hivern a Mallorca aporta una xifra de 369 exemplars, el màxim censat fins al moment. El municipi que aporta els dormidors que aglutinen més exemplars és el de Bunyola amb 65 individus, que enguany ha compartit espai amb un grup de 300 exemplars de corbs, *Corvus corax*. Santa Maria aporta 38 exemplars. La marina de Llucmajor té dos dormidors que sumen un total de 28 milanes, identificant així la zona com un lloc estratègic per a l'espècie al migjorn de l'illa.

Altres zones que destaquen any rere any són Cas Concos amb 53 exemplars, el Parc Natural de la Península de Llevant, que suma 44 exemplars, seguit del municipi de Porreres amb 41 exemplars.

La boira va dificultar el cens a altres localitzacions com la de Calvià o Esporles, on sols es detectaren molt pocs exemplars. Tot el contrari succeí a Caïmari que aporta al cens 59 individus. A Inca es localitzaren 14 exemplars més.

De nou es va comptar amb la participació dels ornitòlegs i aficionats illencs i els Agents de Medi Ambient, als quals cal agrair sempre la seva disponibilitat.