

Per identificar les aus i per saber coses d'elles ens hem de fixar en detalls que sovint ens passen desapercebuts. Aquí et mostrem dues espècies molt diferents, saps quines són?



Aquesta foto és del 4 de gener, a Artà. El que tot d'una ens crida l'atenció és la coa de color vermell, molt característica, i un cos sense colors evidents. Tot i que el rossinyol *Luscinia megarhynchos*, té una coa també vermella, el descartem perquè, entre altres coses, el seu cos és marronós i té les potes més llargues i de color clar. Ens quedem amb el grup de les coa-roges, de les quals podem observar sense problemes dues espècies a Balears, i una tercera que es detecta molt rarament. En els 3 casos hi ha un dimorfisme sexual evident, sent els mascles adults molt fàcils d'identificar, en canvi, les femelles i els joves s'assemblen bastant. En el cas de la coa-roja *Ph. phoenicurus* i de la coa-roja diademada *Phoenicurus moussieri* (aquesta darrera considerada rara a Espanya), les femelles són de color marró-

ataronjat, mentre que en el cas de la coa-roja de barraca són grises. A més, aquestes coa-roges són migrants i per les dates de la fotografia ja les podríem descartar. És, per tant, una coa-roja de barraca *Phoenicurus ochruros*, aparentment una femella, però la imatge no és suficient per definir si es tracta d'un exemplar jove o adult. Hi ha joves mascles de primer any que després de la muda postjuvenil tenen aparença de femella.



L'au de la foto està caminant dins l'aigua i veiem una salicòrnia, planta pròpia de zones salobres. Es va fotografiar el 22 d'octubre a l'albufera de Mallorca. La forma i colors de l'au ens transporta ràpidament al grup dels limícoles, aus relacionades sobretot amb zones de fang i aigües salabroses poc profundes. S'intueix també que es tracta d'una au bastant gran, ja que els limícoles petits tresquen per les voreres, no es fiquen dins l'aigua, i la mida del bec i les potes són llargs. Descartem, per tant, la majoria de gèneres i ens centrem fonamentalment en el dels *Tringa* sp. De tots ells només dos tenen les potes vermelles: la cama-roja *Tringa totanus* i la cama-roja pintada *Tringa erythropus*. Hi ha, però, una espècie fora d'aquest gènere que hem de comprovar: el batallaire *Calidris pugnax*, espècie

amb bastants tipus de plomatges i mides diferents. Alguns mascles de batallaire tenen les potes taronja, però tenen el bec negre o amb la punta negra i la base taronja, on habitualment tenen també un anell de plomes blanques, per tant, descartem que sigui un batallaire. Per la data, i tornant als *Tringa*, podria ser qualsevol de les dues, però el disseny del bec i cap ens indica que és una cama-roja pintada *Tringa erythropus*. La cama-roja *Tringa totanus*, té el bec vermell amb la punta negra, no la mandíbula superior tota negra com té aquest, i no té tampoc la línia ocular blanca i negra que li travessa l'ull, com al de la foto. Les dues generacions de plomes al cos i el color marronós de les que no ha mudat encara ens indica que és un exemplar juvenil.