



Centro Reina Sofía

Ancianos maltratados en el ámbito familiar

Consideraciones previas

- *La fuente tomada para analizar la situación de los ancianos maltratados en el ámbito familiar en España ha sido el Ministerio del Interior. Esta fuente ofrece datos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, pero no de la Policía Autónoma Vasca ni de Mossos d'Esquadra.*
- *Por anciano se entiende cualquier persona de 65 años o más.*
- *Hasta 2002, los datos de ancianos maltratados en el ámbito familiar que ofrecía el Ministerio del Interior eran sobre delitos y faltas de "Malos tratos en el ámbito familiar", "Lesiones" y faltas de "Malos tratos de obra sin lesión". A partir del 2002 también se incluyen otros tipos de lesiones y faltas: delitos contra la libertad e indemnidad sexual, las calumnias, las amenazas y los delitos de homicidio y asesinato.*

Índice

1. Ancianos maltratados en el ámbito familiar
 - 1.1. Delitos y faltas
 - 1.2. Incidencia
 - 1.2.1. Por sexo
 - 1.3. Prevalencia por mil
 - 1.3.1. Por sexo
 - 1.4. Ancianos maltratados por su pareja
 - 1.4.1. Incidencia
 - 1.4.2. Prevalencia por mil
2. Ancianos muertos en el ámbito familiar
 - 2.1. Incidencia
 - 2.1.1. Por sexo
 - 2.2. Prevalencia por millón
 - 2.2.1. Por sexo
 - 2.3. Ancianos asesinados por su pareja
 - 2.3.1. Incidencia
 - 2.3.2. Prevalencia por millón

1. Ancianos maltratados en el ámbito familiar

1.1. Delitos y faltas


La distinción entre delitos y faltas se realiza teniendo en cuenta:

- Las penas que se establecen.
- Las consecuencias de la agresión. Así, son faltas las agresiones que causan una lesión que no requiere objetivamente para su curación más que de una primera asistencia facultativa, sin necesidad de seguir un tratamiento médico o quirúrgico; no se considera tratamiento médico la simple vigilancia o seguimiento facultativo de la lesión.

No obstante, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 11/2003 del 29 de septiembre, se considera delito cualquier agresión desde la primera que se produzca (anteriormente, para ser calificado como tal, existía el requisito de habitualidad de la acción), incluyendo no sólo las agresiones físicas, sino también las de carácter psíquico.

1.2. Incidencia

La incidencia de ancianos maltratados ha aumentado un 113,02%



Año	2000	2001	2002	2003	2004	Variac. 00-04
Incidencia	2.251	2.203	3.765	4.103	4.795	113,02%

1.2.1. Por sexo¹

La incidencia es mayor entre las mujeres pero el incremento, en este periodo, ha sido mayor entre los hombres:

	2000	2001	2002	2003	Variac. 00-03
Hombre	808	765	1.405	1.565	93,69%
Mujer	1.443	1.438	2.360	2.538	75,88%

¹ No se disponen de los datos por sexo de 2004.




El porcentaje que suponen las ancianas maltratadas en los ancianos maltratados en el ámbito familiar es:

2000	2001	2002	2003
64,10	65,27	62,68	61,86

1.3. Prevalencia por mil

La evolución de la prevalencia ha sido similar:



2000	2001	2002	2003	2004	Variac. 00-04
0,33	0,32	0,54	0,58	0,67	103,03%

1.3.1. Por sexo


La prevalencia en mujeres también es mayor que en hombres pero el incremento es mayor entre los hombres:

	2000	2001	2002	2003	Variac. 00-03
Hombre	0,28	0,26	0,48	0,52	85,71%
Mujer	0,37	0,36	0,58	0,62	67,57%

1.4. Ancianos maltratados por su pareja

1.4.1. Incidencia

La incidencia de ancianos maltratados por su pareja se ha incrementado un 93%:



2000	2001	2002	2003	2004	Variac. 00-04
643	634	959	1.059	1.241	93%

El porcentaje de ancianos maltratados por su pareja en relación al total de ancianos maltratados en el ámbito familiar es:

2000	2001	2002	2003	2004	Variac. 00-04
28,57	28,78	25,47	25,81	25,88	-9,42%

Los ancianos maltratados por su pareja según sexo han sido:


	2000	2001	2002	2003	Variac. 00-03
Hombre	133	132	222	246	84,96%
Mujer	510	502	737	813	59,41%

Analizando por sexos los porcentajes de los ancianos maltratados en el ámbito familiar que son maltratados por sus parejas, en las mujeres es el doble que en los hombres:

	2000	2001	2002	2003
Hombre	16,46	17,25	15,80	15,72
Mujer	35,34	34,91	31,23	32,03

1.4.2. Prevalencia por mil

La prevalencia de los ancianos maltratados por su pareja ha crecido un 83,16%:



2000	2001	2002	2003	2004	Variac. 00-04
0,095	0,092	0,137	0,149	0,174	83,16%


La prevalencia de ancianos maltratados por su pareja por sexo es también superior en mujeres que en hombres:

	2000	2001	2002	2003	Variac. 00-03
Hombre	0,047	0,046	0,076	0,082	74,47%
Mujer	0,129	0,125	0,182	0,198	53,49%

2. Ancianos muertos en el ámbito familiar

2.1. Incidencia

Los ancianos asesinados en el ámbito familiar entre 2000 y 2004 han sido:



2000	2001	2002	2003	2004	Variac. 00-04
13	21	22	23	20	53,85%


2.1.1. Por sexo²

Según el sexo de la víctima, hay mayor incidencia en mujeres:

	2000	2001	2002	2003	Variac. 00-03
Hombre	7	8	9	7	0%
Mujer	6	13	13	16	166,67%

2.2. Prevalencia por millón

En este periodo, la prevalencia por millón de ancianos asesinados en el ámbito familiar ha sido:



2000	2001	2002	2003	2004	Variac. 00-04
1,91	3,04	3,15	3,24	2,80	46,60%

2.2.1. Por sexo

Hay un gran incremento entre las mujeres mientras que los hombres han disminuido levemente:


	2000	2001	2002	2003	Variac. 00-03
Hombre	2,46	2,77	3,09	2,34	-4,88%
Mujer	1,52	3,24	3,20	3,90	156,58%

2.3. Ancianos asesinados por su pareja

2.3.1. Incidencia

Los ancianos asesinados por su pareja han sido:

² No se disponen de los datos por sexo de 2004.



2000	2001	2002	2003	2004	Variac. 00-04
5	5	10	6	14	180%

Según el sexo de la víctima:


	2000	2001	2002	2003	Variac. 00-03
Hombre	1	1	2	0	-100%
Mujer	4	4	8	6	50%

El porcentaje que suponen los ancianos asesinados por sus parejas respecto al total de ancianos asesinados en el ámbito familiar, según el sexo, es mucho mayores en mujeres que en hombres:

	2000	2001	2002	2003
Hombre	14,29	12,50	22,22	0
Mujer	66,67	30,77	61,54	37,50
Total	38,16	23,81	45,45	26,09

2.3.2. Prevalencia por millón

La evolución de la prevalencia de asesinatos de ancianos por la pareja es:



2000	2001	2002	2003	2004	Variac. 00-04
0,74	0,72	1,43	0,85	1,96	164,86%

Por sexos, la evolución de la prevalencia ha sido desigual:

	2000	2001	2002	2003	Variac. 00-03
Hombre	0,35	0,35	0,69	0	-100%
Mujer	1,01	1	1,97	1,46	44,55%