



Ministerio de Sanidad y Consumo
Secretaría General de Sanidad
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas

INFORME DE LA ENCUESTA ESTATAL SOBRE
USO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DE
ENSEÑANZAS SECUNDARIAS (ESTUDES)
2006-2007

27 de Septiembre de 2007

Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2006-2007

1. INTRODUCCIÓN

- La encuesta se enmarca en la serie de encuestas que ha venido realizándose en España de forma bienal desde 1994 con el objetivo de conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas entre los estudiantes de 14-18 años que cursan Enseñanzas Secundarias.
- Las encuestas han sido financiadas y promovidas por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y han contado con la colaboración de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas (Planes Autonómicos sobre Drogas y Consejerías de Educación) y del Ministerio de Educación y Ciencia.
- El objetivo general de las mismas es obtener información útil para diseñar y evaluar políticas dirigidas a prevenir el consumo y los problemas de drogas, dirigidas sobre todo al medio familiar y/o escolar. Esta información complementa la obtenida con otras metodologías como los indicadores de problemas de drogas (admisiones a tratamiento, urgencias hospitalarias o mortalidad relacionada con las drogas), la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES), o los indicadores de oferta y control de la oferta.
- Aunque ha habido cambios en el cuestionario y en los procedimientos de obtención de datos a lo largo del período, la metodología ha sido bastante uniforme, por lo que los datos pueden utilizarse para observar tendencias temporales. Por otra parte, el cuestionario y la metodología utilizadas son bastante similares a los de otros países de la Unión Europea y Estados Unidos, lo que permite hacer bastantes comparaciones internacionales.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

- Conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (Ciclos Formativos de Grado Medio), a nivel estatal y autonómico con la finalidad de obtener información útil para diseñar y evaluar políticas dirigidas a prevenir el consumo y los problemas de drogas, dirigidas sobre todo al medio familiar y/o escolar.

2.2 Objetivos específicos

- a) Conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas
- b) Conocer las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.
- c) Conocer algunos patrones de consumo relevantes
- d) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas (disponibilidad percibida, riesgo percibido ante diversas conductas de consumo), los consumidores, y algunos problemas relacionados con el consumo.
- e) Estimar el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones.

3. METODOLOGÍA

3.1 Población de referencia y marco muestral:

- o La población de referencia han sido estudiantes españoles que cursan Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años. La proporción de jóvenes españoles de 14-18 años que cursa este tipo de enseñanzas se situó durante el período en un 75%-82%.

La base o marco muestral utilizado para seleccionar la muestra, fue la población matriculada en colegios o centros educativos con 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), 1º y 2º de Bachillerato LOGSE y Ciclos Formativos de grado medio o equivalentes (Formación Profesional II). Este marco condiciona la distribución de la muestra por edad. De hecho quedan fuera de marco, varios grupos. Por ejemplo, los estudiantes de 14-18 años que estaban cursando educación primaria o educación universitaria, los estudiantes de 14-18 años que no asistieron a clase el día y hora en que se aplicó el cuestionario (ausentes), los estudiantes de Enseñanzas de Régimen General incluidos en Programas de Garantía Social y a distancia, de Enseñanzas de Régimen Nocturno y de Enseñanzas de Régimen Especial. Es bastante probable que el sesgo introducido por el absentismo y los demás factores permanezca relativamente constante a lo largo del tiempo, por lo que la repercusión de este sesgo en las tendencias y cambios temporales de la prevalencia y patrones de consumo es seguramente pequeño. En cualquier caso existe un problema de subrepresentación de los estudiantes de 18 años en la muestra, por lo que conviene estratificar algunos resultados por edad.

3.2 Muestra

- o Se utilizó un muestreo bietápico por conglomerados, seleccionando aleatoriamente colegios como unidades de primera etapa y aulas como unidades de segunda etapa. Posteriormente, fueron incluidos en la muestra

todos los estudiantes de las aulas seleccionadas, con el fin de simplificar el diseño muestral; así como la ejecución y análisis de la encuesta.

- La selección de los colegios se realizó a partir de listados del Ministerio y las Consejerías de Educación. Para seleccionar los colegios, se estratificó previamente el marco muestral según comunidad autónoma (17 estratos, más dos estratos correspondientes a Ceuta y Melilla a partir de 1996) y titularidad jurídica (dos estratos, correspondientes a colegios públicos y privados). A partir de 2000 todos los colegios de cada estrato tuvieron la misma probabilidad de estar en la muestra independientemente de su tamaño. En la tabla 1 figura la distribución de la muestra por CA, titularidad del centro y tipo de estudios.
- Las aulas se seleccionaron una vez que los colegios habían entregado el listado de aulas o grupos de alumnos de los cursos de interés. La selección de aulas se hizo con probabilidad igual entre el conjunto de aulas del colegio. Por razones económicas se decidió seleccionar dos aulas en cada colegio.
- En cada una de las encuestas, se estudió una muestra en torno a 20000-27000 estudiantes (26454 en 2006), 800-1400 aulas (1.322 en 2006), y 400-600 colegios (577 en 2006). Para garantizar una mínima precisión de las estimaciones por comunidad autónoma se estableció un número mínimo de encuestas válidas en cada una de ellas. Algunas CCAA financian ampliaciones de la muestra.
- La proporción de alumnos matriculados que no acudieron a clase el día y hora de la encuesta (ausentes), se situó entre 12% y el 17,1% en las distintas encuestas. En 2006 fue de un 12,1%.

Tabla 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 14-18 AÑOS INCLUIDOS EN LA MUESTRA DE LA ESTUDES SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA, SEGÚN TITULARIDAD JURÍDICA DEL COLEGIO, Y SEGÚN TIPO DE ESTUDIOS. ESPAÑA, 1994-2006.

	Números absolutos							Porcentajes						
	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006
COMUNIDAD AUTÓNOMA														
Andalucía	2.469	2.075	1.976	2.372	2.552	2.464	2.750	11,8	10,9	10,9	11,6	9,6	9,7	10,4
Aragón	1.014	941	775	671	2.185	1.757	1.764	4,8	5,0	4,3	3,3	8,2	6,9	6,7
Asturias	993	875	765	661	744	584	1.737	4,7	4,6	4,2	3,2	2,8	2,3	6,6
Baleares	758	661	679	602	1.762	1.795	622	3,6	3,5	3,8	2,9	6,6	7,0	2,4
Canarias	880	859	966	739	960	835	2.079	4,2	4,5	5,3	3,6	3,6	3,3	7,9
Cantabria	746	575	722	1.244	1.169	1.478	1.376	3,6	3,0	4,0	6,1	4,4	5,8	5,2
Castilla y León	1.356	1.120	1.093	919	1.140	983	1.107	6,5	5,9	6,0	4,5	4,3	3,9	4,2
Castilla- La Mancha	893	982	943	1.749	2.501	860	984	4,3	5,2	5,2	8,6	9,4	3,4	3,7
Cataluña	2.304	1.881	1.681	1.552	1.885	2.831	2.177	11,0	9,9	9,3	7,6	7,1	11,1	8,2
C. Valenciana	1.720	1.466	1.395	2.287	1.685	1.362	1.657	8,2	7,7	7,7	11,2	6,3	5,3	6,3
Extremadura	928	659	718	443	796	1.693	777	4,4	3,5	4,0	2,2	3,0	6,6	2,9
Galicia	1.064	1.436	1.333	1.170	2.108	1.245	2.244	5,1	7,6	7,4	5,7	7,9	4,9	8,5
Madrid	2.123	1.979	1.853	2.929	3.308	3.033	3.055	10,1	10,4	10,2	14,3	12,4	11,9	11,5
Murcia	907	818	813	727	1.394	1.468	1.601	4,3	4,3	4,5	3,6	5,2	5,8	6,1
Navarra	836	659	553	627	530	600	570	4,0	3,5	3,1	3,1	2,0	2,4	2,2
País Vasco	1.293	1.104	1.021	852	806	990	884	6,2	5,8	5,6	4,2	3,0	3,9	3,3
Rioja	647	651	570	462	457	975	525	3,1	3,4	3,2	2,3	1,7	3,8	2,0
Ceuta	0	128	30	323	130	140	289	0,0	0,7	0,2	1,6	0,5	0,5	1,1
Melilla	0	97	199	121	464	428	256	0,0	0,5	1,1	0,6	1,7	1,7	1,0
TITULARIDAD DEL COLEGIO														
Pública	15.204	13.716	12.766	10.421	14.445	14.889	13.050	72,6	72,3	70,6	51,0	54,4	58,3	49,3
Privada	5.727	5.250	5.319	10.029	12.131	10.632	13.404	27,4	27,7	29,4	49,0	45,6	41,7	50,7
TIPO DE ESTUDIOS														
ESO	2.191	5.129	9.560	13.664	14.400	14.415	15.983	10,5	27,0	52,9	66,8	54,2	56,5	60,4
Bachillerato	13.611	10.495	7.312	5.869	10.733	9.468	8.468	65,0	55,3	40,4	28,7	40,4	37,1	32,0
F. Profesional/Ciclos formativos	5.129	3.342	1.213	917	1.443	1.638	2.003	24,5	17,6	6,7	4,5	5,4	6,4	7,6
TOTAL	20.931	18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

3.3 Cuestionario y trabajo de campo

- Se utiliza un cuestionario estandarizado y anónimo parecido al de otras encuestas realizadas en Europa y Estados Unidos. El utilizado durante el período 1994-2004 fue bastante similar, pero en 2006 se introdujeron modificaciones para converger más hacia los cuestionarios internacionales, por lo que en algunos aspectos (no en los referidos a las preguntas sobre consumo, y disponibilidad percibida) se ha resentido en cierta forma la comparabilidad temporal.
- El cuestionario recoge los objetivos planteados anteriormente, e incluye preguntas sobre: características sociodemográficas, consumo de drogas, percepción de riesgo sobre distintas conductas de consumo de drogas, nivel de disponibilidad percibida de las distintas drogas psicoactivas, algunos problemas sociales o de salud, información e intervenciones preventivas sobre drogas, consumo de drogas por parte de los amigos y compañeros, y actitud de los padres con respecto al consumo de drogas. Ver anexo I.
- Se tienen en cuenta las peculiaridades lingüísticas de las distintas Comunidades Autónomas. Por ello, se utilizan versiones del cuestionario en castellano, gallego, vasco, catalán y valenciano.
- El cuestionario se cumplimenta por escrito (papel-y-lápiz) por todos los estudiantes de las aulas seleccionadas durante una clase normal (45-60 minutos), con la presencia del profesor (pero manteniéndose permanentemente en el estrado).
- Todas las encuestas, salvo la de 2004 que se hizo en primavera, se han realizado en otoño (generalmente en noviembre y diciembre), aunque excepcionalmente, Encuesta 2006, hubo que retrasar parte de la encuesta a febrero del año 2007.

- La colaboración de los colegios es buena. En 2006 la proporción de centros sustituidos fue de 20,6%, pero apenas se recibieron negativas de centros para colaborar, debiéndose las sustituciones en la mayoría de los casos a problemas de fechas por exámenes o la proximidad de las vacaciones.
- Por otra parte, el grado de colaboración de los directores, jefes de estudios, y docentes de los centros fue excelente en todas las encuestas. La proporción de estudiantes que se negó cumplimentar el cuestionario fue irrelevante (0,2% en 2006).
- En 1994-1998 la selección de la muestra y el trabajo de campo fueron realizados por la empresa CUANTER, SA y en 2000-2006 por IPD, SA.

3.4 Análisis

- Se ponderaron los resultados por CA, titularidad del centro (público/privado) y tipo de estudios (ESO, bachillerato, formación profesional/ciclos formativos), para corregir la desproporcionalidad de la muestra con respecto al universo. La información sobre la distribución del universo según las tres variables de ponderación se obtuvo del Ministerio de Educación y Ciencia.
- En general todos los cálculos se han efectuado excluyendo del numerador y del denominador los sujetos con valores desconocidos para las variables que intervienen en cada tabulación cruzada.
- Hay que resaltar que la muestra está diseñada para obtener resultados con una precisión aceptable para estimar las prevalencias de consumo de drogas en el conjunto de España, pero no en las comunidades autónomas. Por lo tanto, salvo en el caso del alcohol, el tabaco y el cannabis, las prevalencias estimada para las Comunidades Autónomas tienen unos intervalos de confianza demasiado amplios, sobre todo en las comunidades con menos población, lo que significa que están muy afectadas por el azar y al representar las series temporales pueden generar dientes de sierra y líneas de tendencia engañosas.

4. RESULTADOS

4.1 Extensión del consumo de drogas

- Al igual que en años anteriores en 2006 las drogas más consumidas por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años han sido el alcohol, el tabaco y el cannabis. Un 79,6% ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, un 46,1% tabaco y un 36,2% el cannabis. La proporción de consumidores actuales de estas sustancias, es decir aquellos que las han consumido alguna vez en los 30 días previos a la entrevista, fue de 58%, 27,8%, y 20,1%, respectivamente. El consumo del resto de sustancias (cocaína, éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, sustancias volátiles, heroína, etc.) es mucho más minoritario, situándose entre el 1% y el 6% la proporción de estudiantes que las han probado alguna vez y entre el 0,5% y el 2,3% la proporción de consumidores actuales (tabla 2).

Tabla 2. EVOLUCIÓN DE LAS PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS (PORCENTAJES). ESPAÑA 1994-2006.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida							
Tabaco	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1
Alcohol	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6
Hipnosedantes*	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6
Cannabis	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2
Éxtasis	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3
Alucinógenos	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1
Anfetaminas	4,2	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4
Cocaína	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7
Heroína	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0
I.Volátiles	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0
Prevalencia de consumo en los 12 últimos meses							
Alcohol	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9
Hipnosedantes*	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8
Cannabis	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8
Éxtasis	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8
Anfetaminas	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6
Cocaína	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1
Heroína	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8
I.Volátiles	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días							
Tabaco	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	37,4	27,8
Alcohol	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0
Hipnosedantes*	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4
Cannabis	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1
Éxtasis	2,1	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4
Alucinógenos	2,6	2,8	2,0	2,0	1,2	1,5	1,3
Anfetaminas	2,3	2,6	2,0	2,0	2,0	1,8	1,4
Cocaína	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3
Heroína	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5
I.Volátiles	1,1	1,2	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

(*) Tranquilizantes y pastillas para dormir sin receta médica.

FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 1994-2006.

- Una mención aparte merece el consumo de tranquilizantes y/o somníferos. La proporción de estudiantes que han consumido alguna vez estas sustancias es de un 12,6%, y la de los que los han consumido sin receta médica de un 7,6%. La proporción de consumidores actuales (últimos 30 días) fue de un 3,6%, y un 2,4% respectivamente.
- Si comparamos estos resultados con los de las encuestas precedentes observamos una reducción del consumo de la mayoría de las sustancias, más acusado en el caso del tabaco, del cannabis y de la cocaína (tabla 2). Estas dos últimas sustancias son, por otra parte, las drogas ilegales más extendidas y cuyo consumo había crecido más en los últimos años.

4.2 Edad media de inicio en el consumo

- Los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años comienzan a consumir drogas a una edad temprana. En 2006 las sustancias que empezaban a consumir más tempranamente eran el tabaco, las sustancias volátiles (en este caso por una minoría) y el alcohol, cuyas edades medias de inicio se situaron entre los 13 y los 14 años. Le siguen los tranquilizantes y el cannabis (14,2 y 14,6 años, respectivamente). Por su parte, la cocaína, el éxtasis, los alucinógenos y las anfetaminas son las sustancias que se empiezan a consumir a una edad más tardía (15,4, 15,5 y 15,6 años, respectivamente (Tabla 3).
- No hay variaciones significativas de la edad de inicio en el consumo por sexo.
- Tampoco hay variaciones significativas en la edad de inicio en la mayor parte de las drogas respecto a años anteriores, si bien en el caso de los tranquilizantes, la cocaína y las sustancias volátiles se comienza a consumir un poco antes, y la heroína un poco más tarde (Tabla 3).

Tabla 3. EVOLUCIÓN DE LA EDAD MEDIA DE INICIO EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS (EDAD MEDIA (AÑOS)), ESPAÑA 1994-2006.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006
Tabaco	13,9	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,1
Tabaco (consumo diario)	--	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,2
Alcohol	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,8
Alcohol (consumo semanal)	--	15,0	15,0	14,9	15,0	15,1	15,0
Hipnosedantes*	14,1	14,5	14,8	14,5	14,6	14,8	14,4
Cannabis	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,7	14,6
Cocaína	15,6	15,9	15,8	15,8	15,7	15,8	15,4
Heroína	14,3	14,7	14,4	15,4	14,9	14,4	14,7
Anfetaminas	15,5	15,7	15,6	15,6	15,6	15,7	15,6
Alucinógenos	15,4	15,6	15,4	15,5	15,5	15,8	15,5
S. Volátiles	13,3	13,6	13,4	13,9	14,3	14,0	13,6
Éxtasis	15,6	15,7	15,5	15,7	15,4	15,6	15,5

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

(*) Tranquilizantes y pastillas para dormir sin receta médica.

FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), 1994-2006.

4.3 Diferencias intersexuales en el consumo de drogas

- La extensión del consumo de drogas en los estudiantes de 14 a 18 años varía mucho según el sexo. Los chicos consumen mucho más todas las drogas ilegales que las chicas, mientras que con el tabaco y los tranquilizantes sucede lo contrario. En el caso de las bebidas alcohólicas la proporción de consumidores es parecida. Sin embargo, la intensidad del consumo de tabaco y alcohol entre los consumidores es más elevada en los hombres que en las mujeres.
- En el caso de las drogas ilegales las diferencias por sexo son más acusadas a medida que el consumo es más reciente o intensivo. De hecho, las diferencias intersexuales en la proporción de consumidores en los últimos 30 días son mayores que en la proporción de consumidores alguna vez en vida. Estas diferencias se han observado también en encuestas precedentes (Tabla 4).

Tabla 4. EVOLUCIÓN DE LAS PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14—18 AÑOS, SEGÚN SEXO (PORCENTAJES), ESPAÑA 1994-2006.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Consumo alguna vez en la vida														
Tabaco	56,6	65,1	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	64,1	42,0	49,8
Alcohol	84,3	84,0	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7
Hipnosedantes*	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2
Cannabis	23,8	18,0	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	40,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6
Éxtasis	4,7	2,5	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5
Alucinógenos	6,7	3,6	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7
Anfetaminas	5,3	3,1	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7
Cocaína	3,1	1,9	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7
Heroína	0,7	0,3	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5
I.Volátiles	4,1	2,1	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,1	2,0
Consumo en los 12 últimos meses														
Alcohol	82,8	82,7	82,3	82,5	83,0	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3
Hipnosedantes*	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8
Cannabis	21,2	15,2	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2
Éxtasis	4,2	2,2	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,3	1,6
Alucinógenos	5,7	3,1	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6
Anfetaminas	4,4	2,5	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0
Cocaína	2,3	1,2	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1
Heroína	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3
I.Volátiles	2,5	1,3	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,6	1,1
Consumo en los últimos 30 días														
Tabaco	26,0	36,3	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	32,9	41,9	24,8	30,6
Alcohol	75,3	74,9	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0
Hipnosedantes*	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8
Cannabis	15,1	9,8	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	28,5	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0
Éxtasis	2,9	1,4	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7
Alucinógenos	3,6	1,7	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7
Anfetaminas	2,9	1,6	3,2	2,0	2,7	1,5	2,6	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0
Cocaína	1,4	0,7	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6
Heroína	0,4	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2
I.Volátiles	1,5	0,8	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

(*) Tranquilizantes y pastillas para dormir sin receta médica.

FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), 1994—2006.

4.4 Diferencias en el consumo por edad

- o La edad es una variable que influye decisivamente en la extensión del consumo de drogas en esta población. La proporción de consumidores aumenta progresivamente con la edad, alcanzando su máximo entre los estudiantes de 18 años.
- o Los mayores incrementos en la extensión del consumo de alcohol, tabaco y cannabis se producen entre los 14 y los 16 años, mientras que en los psicoestimulantes como el éxtasis, la cocaína o las anfetaminas se producen entre los 16 y los 18 años (Tabla 5).

Tabla 5. PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS, SEGÚN EDAD (PORCENTAJES). ESPAÑA, 2006.

Edad (años)	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez en la vida					
Tabaco	28,4	41,5	50,7	55,1	61,8
Alcohol	57,1	76,1	86,0	91,2	92,3
Hipnosedantes *	6,3	7,0	7,7	8,4	9,8
Cannabis	14,1	30,0	41,1	48,9	56,9
Éxtasis	0,8	2,0	3,3	4,4	9,3
Alucinógenos	1,1	2,9	4,3	5,9	9,2
Anfetaminas	0,7	2,1	3,3	4,8	9,5
Cocaína	1,5	2,9	5,6	8,4	15,9
Heroína	0,6	0,8	1,3	1,0	1,1
Inhalables volátiles	1,5	2,5	3,0	4,2	4,6
GHB	0,4	0,8	1,4	1,6	2,2
Consumo en los últimos 12 meses					
Tabaco	19,1	30,6	37,6	41,3	47,4
Alcohol	50,9	70,9	82,1	87,4	88,2
Hipnosedantes *	3,8	4,5	5,3	5,1	5,8
Cannabis	11,5	25,2	33,9	40,7	44,9
Éxtasis	0,6	1,6	2,5	3,3	6,0
Alucinógenos	0,8	1,9	3,2	4,0	6,0
Anfetaminas	0,5	1,7	2,7	3,7	6,8
Cocaína	1,2	2,3	4,2	5,6	11,1
Heroína	0,4	0,7	1,1	0,8	0,9
Inhalables volátiles	0,9	1,6	2,1	2,3	2,7
GHB	0,4	0,7	1,1	1,0	1,6
Consumo en los últimos 30 días					
Tabaco	13,8	24,1	30,6	35,5	42,1
Alcohol	31,7	50,7	65,3	74,2	76,5
Hipnosedantes *	1,8	2,3	2,7	2,6	2,9
Cannabis	7,5	16,6	22,5	27,7	31,5
Éxtasis	0,4	1,0	1,8	1,7	2,4
Alucinógenos	0,5	0,9	1,5	1,9	2,5
Anfetaminas	0,3	0,9	1,6	2,1	3,3
Cocaína	0,8	1,2	2,6	3,1	5,9
Heroína	0,2	0,4	0,8	0,5	0,7
Inhalables volátiles	0,6	1,1	1,4	1,1	1,6
GHB	0,4	1,0	1,8	1,7	2,4

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

* Tranquilizantes y pastillas para dormir sin receta médica.

Fuente: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES)

4.5 Consumo de tabaco

- El consumo de tabaco está bastante extendido entre los estudiantes de 14 a 18 años, siendo la segunda sustancia más consumida entre ellos.
- En 2006 un 46,1% de los estudiantes afirmaba haberlo probado alguna vez, un 34% haberlo fumado en los últimos 12 meses, y un 27,8% en los últimos 30 días. El porcentaje de fumadores diarios era de un 14,8%, porcentaje que ascendía al 29,6% entre los estudiantes de 18 años (Tabla 6).
- La proporción de consumidores aumenta la edad y es mayor en las chicas que en los chicos en todas las edades (Tabla 6).
- La edad media de inicio es la más temprana de todas las drogas consideradas (13,1 años) y está más o menos estabilizada desde hace 10 años, siendo similar para ambos sexos. La edad media de inicio en el consumo diario se produce un año después (14,2 años).
- Entre los consumidores de tabaco en los últimos 30 días, el consumo medio de cigarrillos al día es de 5,5, cifra inferior a la del año 2004 que era de 7,7 cigarrillos, siendo ligeramente mayor la cantidad fumada por los chicos (5,8) que por las chicas (5,3).
- Los datos del 2006 nos muestran un descenso importante del consumo de tabaco respecto a los años anteriores. El consumo diario ha descendido de un 21,5% en 2004 al 14,8 % en el 2006.
- La gran mayoría de los estudiantes que fuma se ha planteado dejar de fumar en alguna ocasión (72,9%), aunque los que afirman haberlo intentado son poco más de la mitad de ellos (38,6%). La intención de dejar de fumar se hace más patente en las chicas (76,6%) que en los chicos (67,8%), siendo también mayor entre ellas el porcentaje de quienes lo han intentado realmente (41% frente al

35,4%). En la actualidad un 53,2 % de los estudiantes que fuman están pensando seriamente en dejar de fumar (el 25,9% en los próximos 30 días y el 27,3 % en los próximos 6 meses).

- A casi la mitad de los estudiantes (48,1%) les molesta mucho o bastante que fumen en lugares cerrados cuando ellos están presentes.
- En un 47,7% de los hogares en que viven los estudiantes fuma alguna persona diariamente (un 10 % menos que en 2004).

Tabla 6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONSUMO DE TABACO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS (MEDIAS Y PORCENTAJES), SEGÚN SEXO. ESPAÑA 1994-2006.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856
Prevalencia consumo tabaco alguna vez en la vida	56,0	65,1	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	64,1	42,0	49,8
Edad mediana e inicio del consumo de tabaco en fumadores actuales y exfumadores (años)	13,7	14,1	13,1	13,5	13,0	13,4	12,9	13,2	13,0	13,1	13,1	13,2	13,0	13,1
Prevalencia de consumo de tabaco últimos 30 días	26,0	36,3	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6
Prevalencia de consumo diario de tabaco	17,8	25,4	19,0	28,1	17,9	27,5	19,3	27,0	17,7	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9
Edad media de inicio en el consumo diario de tabaco en fumadores actuales y exfumadores (años)	--	--	14,5	14,6	14,6	14,5	14,4	14,3	14,4	14,3	14,5	14,4	14,3	14,2
Nº cigarrillos diarios consumidos diariamente														
1-5	37,7	47,3	41,8	50,3	43,8	49,5	44,4	49,0	44,7	46,5	41,6	44,5	61,9	63,0
6-10	33,8	36,8	33,9	34,8	35,2	34,9	34,8	35,2	33,5	36,0	35,7	35,5	22,7	27,2
11-20	26,0	14,9	22,7	13,9	19,6	15,0	20,8	15,8	20,1	16,3	20,9	19,0	13,8	9,3
21 ó más	2,5	1,0	1,6	0,9	1,3	0,6	0,0	0,0	1,7	1,2	1,8	1,0	1,5	0,5
Nº medio de cigarrillos diarios	9,1	7,2	8,3	6,9	7,9	7,0	7,6	6,8	7,8	7,3	8,1	7,5	5,8	5,3

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), 1994—2006.

4.6 Consumo de bebidas alcohólicas

- El alcohol es la sustancia cuyo consumo está más extendido entre los estudiantes de 14 y 18 años. El 79,6 % lo han probado alguna vez, el 74,9% lo han consumido en el último año y en el 58% en el último mes. A medida que avanza la edad el porcentaje de estudiantes que bebe aumenta, alcanzando la proporción de consumidores mensuales el 76,5% a los 18 años (Tabla 7).
- El consumo de alcohol se concentra en el fin de semana. De los estudiantes que han consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, prácticamente todos (99,5%) han bebido en fin de semana, mientras que sólo un 32,4% lo ha hecho en días laborables. Un 21,8% del conjunto de estudiantes encuestados beben todos los fines de semana (24,3% chicos y 19,5% chicas).
- El 55,3% de los estudiantes se ha emborrachado alguna vez. De los que han consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días un 44,1% se ha emborrachado alguna vez en ese período. Esta última proporción aumenta con la edad y es bastante parecida en chicos y chicas (Tabla 7).
- Un 53,4% de los estudiantes (47,3% chicas y 59,8% chicos) han tomado durante los últimos 30 días 5 o más cañas/copas de bebidas alcohólicas en la misma ocasión. El 17,7% lo ha hecho más de 4 días el último mes.
- Se bebe sobre todo en bares o pubs, en espacios abiertos (calles, plazas, parques) o en discotecas. En los últimos 30 días un 73,5% de los consumidores lo ha hecho en bares o pubs, un 64,5% en espacios abiertos y un 61,4% en discotecas.

Tabla 7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS, SEGÚN SEXO (PORCENTAJES),. ESPAÑA 1994-2006.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856
Prevalencia consumo de alcohol alguna vez en la vida	84,3	84,0	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7
Edad mediana e inicio del consumo de alcohol (años)	13,1	13,8	13,5	14,0	13,5	14,0	13,4	13,8	13,4	13,8	13,6	13,9	13,7	13,8
Edad mediana e inicio del consumo semanal de alcohol (años)	—	—	15,0	15,0	15,0	15,1	14,8	14,9	15,0	14,9	15,2	15,1	15,0	14,9
Prevalencia de consumo de alcohol en últimos 12 meses	82,8	82,7	82,3	82,5	83,0	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3
Prevalencia de consumo de alcohol en últimos 30 días	75,3	74,9	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0
Prevalencia de consumo de alcohol en fin de semana últimos 30 días	—	—	66,0	66,4	67,0	68,1	60,1	59,8	56,3	55,2	65,1	65,5	57,7	57,7
Prevalencia de consumo de alcohol en días laborables últimos 30 días	—	—	26,8	14,9	26,0	16,1	30,0	16,8	20,8	10,6	26,5	14,1	24,2	13,9
Frecuencia de borrachera en los últimos 30 días, entre los estudiantes que han consumido alcohol en estos 30 días														
Ninguna borracheras	77,7	79,5	75,2	78,8	75,2	76,4	62,1	66,6	62,1	65,8	55,3	59,4	54,4	57,2
1-2 borracheras	14,7	15,2	15,4	16,5	16,4	17,8	23,9	23,7	24,3	24,9	25,6	28,3	28,9	30,7
3-5 borracheras	4,9	4,2	6,8	4,0	5,8	4,9	10,5	7,7	9,8	7,3	12,9	9,8	12,6	10,3
+ de 5 borracheras	2,6	1,2	2,6	0,8	2,6	0,9	3,5	2,0	3,9	2,0	6,2	2,5	4,1	2,3

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES).

- Globalmente la bebida consumida por mayor número de estudiantes son los combinados/cubatas, si bien en días laborables la bebida predominante es la cerveza (Tabla 8).
- Los lugares donde los estudiantes consiguen con más frecuencia bebidas alcohólicas son bares o pubs (70,8%), discotecas (59,2%), supermercados (51,8%) e hipermercados (37%).
- El 22% de los estudiantes de 14-18 años (34,3% de los de 18) reconocen haber sido pasajeros en los últimos 12 meses de vehículos conducidos bajo los efectos del alcohol.
- El 9,8% de los estudiantes de 14-18 años declaran haber conducido en los últimos 12 meses un vehículo (coche, moto) bajo los efectos del alcohol, cifra que asciende a un 14,9% en los estudiantes de 18 años.
- La proporción de consumidores de alcohol ha descendido tanto si se toma como referencia 1994 como 2004. De hecho, la proporción de los que habían consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses pasó de 82,7% en 1994 a 81,0% en 2004 y 74,9% en 2006, y la proporción de bebedores en los últimos 30 días de 75,1% en 1994 a 65,6% en 2004 y 58,0% en 2006. Por su parte, la frecuencia de borracheras en los últimos 30 días entre los que han consumido en alcohol en ese periodo ha aumentado ligeramente con respecto a 2004.

Tabla 8. PREVALENCIA DE CONSUMO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN DÍAS LABORABLES Y FIN DE SEMANA DURANTE LOS 30 DÍAS PREVIOS A LA ENCUESTA ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS (PORCENTAJES). ESPAÑA 1996-2006.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006
CONSUMO EN DÍAS LABORABLES						
Algún día de lunes a jueves durante los últimos 30 días						
Vino	8,1	8,9	8,2	4,9	6,6	5,3
Cerveza	15,3	14,0	16,2	10,5	14,1	12,8
Aperitivos	3,0	3,2	2,6	1,7	2,4	3,0
Combinados	5,4	6,4	6,8	5,0	6,8	7,4
Licores fuertes	3,2	3,6	3,5	2,3	3,2	3,5
Licores frutas	6,6	7,5	6,2	3,8	4,2	4,6
Todos los días de lunes a jueves durante los últimos 30 días						
Vino	0,8	1,0	0,9	0,3	0,7	0,2
Cerveza	1,7	1,5	2,2	0,9	1,7	0,8
Aperitivos	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2
Combinados	0,2	0,3	0,6	0,2	0,6	0,4
Licores fuertes	0,1	0,4	0,4	0,1	0,4	0,2
Licores frutas	0,3	0,8	0,6	0,2	0,5	0,2
CONSUMO ALGÚN FIN DE SEMANA						
Algún día de viernes a domingo durante los últimos 30 días						
Vino	32,8	32,8	23,7	21,0	27,7	18,8
Cerveza	46,9	40,7	30,8	27,1	34,1	27,9
Aperitivos	12,0	13,6	9,6	8,0	11,0	8,3
Combinados	48,8	53,7	49,2	48,2	58,4	51,6
Licores fuertes	24,5	26,7	22,4	22,3	27,8	23,0
Licores frutas	36,2	37,1	25,6	22,6	26,0	20,6
Todos los días de viernes a domingo durante los últimos 30 días						
Vino	9,6	10,6	8,6	5,9	7,5	3,5
Cerveza	19,9	17,6	14,4	10,7	13,8	8,6
Aperitivos	2,9	4,2	3,3	2,1	2,7	1,5
Combinados	19,6	23,5	22,2	18,9	22,5	16,8
Licores fuertes	8,2	10,8	10,1	7,7	9,4	5,5
Licores frutas	10,2	12,0	9,0	6,0	6,8	3,8

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES).

4.7 Consumo de tranquilizantes o somníferos

- En el cuestionario se denomina tranquilizantes o pastillas para dormir a un grupo de medicamentos en los que se incluyen benzodiazepinas, barbitúricos y otros hipnóticos o tranquilizantes.
- En 2006 se incluyó una pregunta relacionada por el consumo de tranquilizantes o somníferos sin hacer consideraciones con respecto a la existencia o no de prescripción médica, pregunta que no existía en los cuestionarios de las encuestas precedentes. No obstante, se mantuvo la

pregunta tradicional sobre consumo de tranquilizantes o somníferos sin receta médica.

- En 2006 un 12,6 % de los estudiantes había consumido tranquilizantes o somníferos alguna vez en la vida, un 7,4% en los últimos 12 meses y un 3,6 % en los últimos 30 días (Tabla 9).
- El consumo sin receta es algo inferior, con proporciones de consumidores de 7,6% alguna vez en la vida, 4,8 % en los últimos doce meses y 2,4% en los últimos treinta día.
- El consumo de tranquilizantes o somníferos, al contrario que lo que ocurre con las drogas ilegales, está más extendido entre las chicas que entre los chicos (Tabla 9).
- La proporción de consumidores alguna vez en la vida aumenta, como es lógico, con la edad, sin embargo, la proporción de consumidores actuales (en los últimos 30 días) permanece sin apenas variaciones a partir de los 16 años.
- La edad media en que los estudiantes comienzan a consumir tranquilizantes o somníferos se sitúa en los 13,8 años cuando es con receta médica, y en los 14,2 años cuando es sin receta.
- La frecuencia de consumo es esporádica: más de la mitad del los que han consumido alguna vez en los últimos 30 días lo han hecho 1 o dos días, y la proporción de los que lo han hecho 10 o más días el 0,2 %.
- En cuanto a la evolución del consumo respecto a años precedentes se observa un ligero incremento desde el 2002 en el consumo alguna vez en la vida, sin embargo parece mas o menos estabilizado el consumo más reciente (últimos 12 meses) y el consumo actual (últimos 30 días). Esta evolución es similar para ambos sexos.

Tabla 9. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONSUMO DE HIPNOSEDANTES* ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS (PORCENTAJES), SEGÚN SEXO. ESPAÑA 1994-2006.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856
Prevalencia uso hipnosedantes con receta alguna vez en la vida	5,8	8,1	6,6	9,1	6,4	9,3	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	9,3	13,6
Prevalencia uso hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2
Edad media al inicio del consumo de hipnosedantes (años)	13,6	14,4	13,9	14,8	14,4	15,0	14,3	14,7	14,4	14,8	14,7	14,9	13,8	14,4
Prevalencia uso de hipnosedantes sin receta últimos 12 meses	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8
Prevalencia uso hipnosedantes sin recetas en últimos 30 días	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8
Frecuencia uso hipnosedantes sin recetas en últimos 30 días														
Nunca	98,1	96,7	98,5	97,1	98,5	97,0	98,3	96,6	98,3	96,9	98,2	97,0	98,0	97,1
1 a 2 días	1,3	2,1	1,1	1,9	1,0	2,1	1,0	2,2	1,1	2,0	1,0	2,0	1,2	2,0
3 a 5 días	0,3	0,7	0,2	0,7	0,3	0,5	0,4	0,7	0,3	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5
6 a a9 días	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2
10 a 19 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

(*) Tranquilizantes o pastillas para dormir.

FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 1994-2006.

4.8 Consumo de cannabis

- El cannabis es la droga ilegal consumida por un mayor número de estudiantes de 14 a 18 años, con bastante diferencia sobre las demás. Un 36,2 % la han probado alguna vez en la vida, un 29,8 % lo han consumido en el último año y un 20,1 % en los últimos 30 días.
- El consumo está más extendido en los chicos en todos los indicadores, sin bien esta diferencia no es tan acusada como en otras sustancias ilegales, aunque aumenta al hacerlo la intensidad del consumo. El porcentaje de consumidores diarios de cannabis es de un 3,2%, casi el doble en los chicos (4,2%) que en las chicas (2,2%). (Tabla 10).
- El cannabis es también la droga ilegal que se empieza a consumir a una edad más temprana. La edad media de inicio en el consumo en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años se sitúa en los 14,6 años, siendo similar en ambos sexos y no mostrando variaciones significativas con respecto a años anteriores.

Tabla 10. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONSUMO DE CANNABIS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS (PORCENTAJES), SEGÚN SEXO. ESPAÑA 1994-2006.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856
Prevalencia de consumo de cannabis alguna vez en la vida	23,8	18,0	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	46,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6
Edad media al inicio del consumo de cannabis (años)	15,1	15,2	15,1	15,2	14,9	15,1	14,8	15,0	14,6	14,8	14,6	14,8	14,5	14,6
Prevalencia de consumo de cannabis en últimos 12 meses	21,2	15,2	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2
Frecuencia de consumo de cannabis en últimos 30 días	15,1	9,8	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	25,8	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0
Nunca	84,9	90,2	81,6	86,8	79,7	85,5	75,5	83,1	74,2	80,4	71,7	78,0	77,7	82,0
1 a 2 días	6,9	5,1	7,3	7,2	8,4	7,4	8,6	8,8	8,6	9,1	9,4	9,8	7,4	7,4
3 a 5 días	3,0	2,1	4,1	2,7	3,8	3,0	4,7	3,5	4,8	3,8	4,4	4,5	5,3	4,8
6 a a9 días	2,1	1,4	2,9	1,3	3,2	1,9	3,1	1,9	3,9	2,8	3,5	2,6	2,5	1,8
10 a 19 días	1,5	0,6	2,0	1,0	2,1	1,3	3,5	1,3	3,0	1,8	3,5	2,3	2,9	1,8
20 a 29 días	1,5	0,6	2,2	0,9	2,8	1,0	4,7	1,4	5,5	2,1	7,4	2,8	4,2	2,2

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), 1994—2006.

- o La extensión y la frecuencia de consumo de cannabis aumenta desde los 14 a los 18 años, produciéndose el mayor aumento entre los 14 y los 15 años. Un tercio de los estudiantes de 18 años ha consumido cannabis en los últimos 30 días, y un 11,9 % lo ha hecho más de 10 días en dicho período (Tabla 11).

Tabla 11. FRECUENCIA EN CONSUMO DE HACHÍS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS, SEGÚN EDAD (PORCENTAJES). ESPAÑA, 2006.

Edad (años)	14	15	16	17	18
Ningún día	92,5	83,4	77,5	72,3	68,3
Algún día	7,5	16,6	22,5	27,7	31,7
1-3 días	5,1	8,7	11,3	12,6	12,9
4-9 días	1,4	3,8	5,6	7,2	6,9
10-19 días	0,5	2,1	2,3	3,4	4,4
20 o más días	0,5	2,0	3,4	4,7	7,5

Fuente: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES)

- o En 2006 se ha observado un importante descenso del consumo, después de muchos años de aumento continuado. De hecho, han descendido con respecto a 2004 tanto la proporción de los que lo han consumido alguna vez en la vida, como la de los que lo consumen actualmente, y el descenso ha afectado a todas las edades y tanto a hombres como a mujeres (Tabla 11). Paralelamente ha aumentado la percepción de riesgo ante el consumo de cannabis.

4.9 Consumo de cocaína

- o La cocaína es, después del cannabis, la droga cuyo consumo está más extendido entre los estudiantes: un 5,7% la han consumido alguna vez en la vida, un 4,1 % en los últimos 12 meses y un 2,3 % en los últimos 30 días.

- Se trata fundamentalmente de un consumo esporádico. De hecho, algo más de la mitad de los que lo han consumido en el último mes lo han hecho uno o dos días (Tabla 12).
- En el cuestionario de 2006 se preguntó por primera vez separadamente por el consumo de cocaína en polvo (clorhidrato de cocaína) y por el consumo de cocaína base (crack). La forma de consumo más extendida con diferencia entre los estudiantes es la cocaína en polvo. Los datos que se presentan corresponden en todos los casos a ambas drogas en conjunto, con objeto de poder hacer comparaciones con los años precedentes.
- El consumo es muy superior en hombres que en mujeres en todas las edades, a excepción de los 14 años donde es similar en ambos sexos, aunque bastante reducido, puesto que la expansión del consumo se produce sobre todo entre 17 y 18 años (Tabla 12).
- La edad media de inicio en el consumo se produjo a los 15,4 años en el 2006, un poco antes que en años anteriores.
- Los datos del 2006 nos muestran que se ha producido un descenso acusado del consumo de cocaína, rompiendo con la tendencia creciente de los últimos años. Este descenso se ha producido sobre todo en los 17 y 18 años, edades en las que había aumentado mucho en 2004.

Tabla 12. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONSUMO DE COCAÍNA ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS (PORCENTAJES), SEGÚN SEXO. ESPAÑA 1994-2006.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856
Prevalencia de consumo de cocaína alguna vez en la vida	3,1	1,9	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7
Edad media al inicio del consumo de cocaína (años)	15,7	15,5	15,9	15,9	15,9	15,7	16,0	15,6	15,8	15,6	15,9	15,7	15,4	15,4
Prevalencia de consumo de cocaína en últimos 12 meses	2,3	1,2	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1
Prevalencia de consumo de cocaína en últimos 30 días	1,4	0,7	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6
Frecuencia de consumo de cocaína en últimos 30 días														
Nunca	98,6	99,3	97,9	98,8	96,8	98,2	96,6	98,5	96,3	97,2	94,9	97,4	96,9	98,4
1 a 2 días	0,9	0,4	1,5	0,8	1,8	1,0	2,5	1,1	2,3	2,1	3,1	1,7	1,6	1
3 a 5 días	0,2	0,2	0,3	0,2	0,6	0,5	0,5	0,2	0,9	0,5	1,0	0,5	0,7	0,3
6 a a9 días	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,6	0,2	0,3	0,1
10 a 19 días	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.
FUENTE: DGPNSD. Encuesta de Drogas sobre la Población Escolar(E.D.P.E) 1994-2006.

4.10 Consumo de éxtasis

- El éxtasis es una denominación genérica para varias drogas sintéticas estimulantes derivadas de la feniletilamina.
- En 2006 un 3,3% de los estudiantes habían probado esta sustancia alguna vez en la vida, un 2,4% en los últimos 12 meses y un 1,4% en los últimos 30 días (Tabla 13).
- Como en el caso de las demás drogas ilegales, la proporción de consumidores entre los hombres es muy superior a la de las mujeres, y esta diferencia es más acusada en los consumos más recientes o intensos. Así, en los últimos 30 días el porcentaje de chicos que han consumido éxtasis es de un 2,1% frente a un 0,7 % de chicas.
- Como sucede con la cocaína y otros psicoestimulantes y alucinógenos se trata de un consumo esporádico. De hecho, la mayoría de los que han consumido en el último mes lo han hecho uno o dos días en dicho periodo (Tabla 13).
- El consumo aumenta con la edad. En el 2006 la extensión del consumo se ha producido sobre todo entre los 15 y 16 años.
- La edad media de inicio en el consumo se situó en los 15,5 años, sin variaciones significativas por sexo o con respecto a años anteriores.
- El consumo sigue una tendencia al descenso suave tanto en chicos como en chicas.

Tabla 13. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONSUMO DE ÉXTASIS* ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS (PORCENTAJES), SEGÚN SEXO. ESPAÑA 1994-2006.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856
Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida	4,7	2,5	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5
Edad media al inicio del consumo de éxtasis (años)	15,7	15,5	15,6	15,7	15,5	15,5	15,9	15,4	15,4	15,3	15,7	15,4	15,4	15,5
Prevalencia de consumo de éxtasis en últimos 12 meses	4,2	2,2	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,2	1,7
Prevalencia de consumo de éxtasis en últimos 30 días	2,9	1,4	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7
Frecuencia de consumo de éxtasis en últimos 30 días														
Nunca	97,1	98,6	97,2	98,1	98,1	98,7	96,2	98,3	97,9	98,4	98,1	99,0	97,8	99,3
1 a 2 días	1,6	1,0	1,3	1,2	1,0	0,6	2,2	1,3	1,6	1,1	1,0	0,7	1,4	0,4
3 a 5 días	0,6	0,2	0,7	0,4	0,3	0,3	1,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
6 a 9 días	0,4	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,0
10 a 19 días	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
20 a 29 días	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

(*) Éxtasis u otras drogas de diseño.

FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 1994—2006.

4.11 Consumo de anfetaminas

- Bajo esta denominación se recoge la anfetamina y la metanfetamina, tanto en forma de base como en forma de sal, y tanto en polvo como en comprimidos.
- La extensión del consumo en 2006 fue similar a la de éxtasis. Un 3,4% de los estudiantes las había consumido alguna vez en la vida, un 2,6% en los últimos 12 meses y un 1,4 % en los últimos 30 días (Tabla 14).
- El consumo está más extendido en los varones, y se incrementa con la edad. La mayor extensión del consumo se produjo entre los 17 y los 18 años.
- Se trata también de un consumo generalmente esporádico.
- La edad de inicio en el consumo se situó en los 15,6 años, siendo similar en ambos sexos y mostrándose relativamente estable en los últimos años.
- El consumo de anfetaminas también desciende en 2006, continuando la tendencia iniciada en el 2004 (Tabla 14).

Tabla 14. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONSUMO DE ANFETAMINAS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS (PORCENTAJES), SEGÚN SEXO. ESPAÑA 1994-2006.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856
Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida	5,3	3,1	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7
Edad media al inicio del consumo de anfetaminas (años)	15,5	15,4	15,7	15,7	15,7	15,5	15,7	15,3	15,6	15,5	15,8	15,6	15,6	15,5
Prevalencia de consumo de anfetaminas en últimos 12 meses	4,4	2,5	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0
Prevalencia de consumo de anfetaminas en últimos 30 días	2,9	1,6	3,2	2,0	2,7	1,5	2,5	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0
Frecuencia de consumo de anfetaminas en últimos 30 días														
Nunca	44,8	49,8	51,8	52,0	51,1	53,1	55,1	59,1	57,9	66,8	97,3	99,0	98,0	99,0
1 a 2 días	32,7	33,6	31,5	29,0	29,5	29,9	31,6	27,4	30,1	23,6	1,3	0,6	1,0	0,6
3 a 5 días	10,6	8,9	8,8	12,5	8,4	8,9	7,0	9,7	5,9	6,1	0,6	0,2	0,4	0,2
6 a a9 días	7,0	3,7	5,5	4,5	5,3	3,9	0,9	1,9	3,7	2,1	0,4	0,1	0,2	0,0
10 a 19 días	3,1	2,3	0,7	0,7	2,8	1,8	4,3	0,5	1,3	1,0	0,2	0,0	0,1	0,0
20 a 29 días	1,8	1,6	1,8	1,3	2,9	2,4	1,1	1,3	1,0	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 1994—2006.

4.12 Consumo de alucinógenos

- En 2006 un 4,1 % de estudiantes de secundaria los habían consumido alguna vez en la vida, un 2,8 % en los últimos 12 meses y un 1,3 % en los últimos 30 días (Tabla 15).
- El consumo está mucho más extendido en los chicos llegando a duplicar los valores de las chicas.
- Como ocurre con el resto de sustancias el consumo se extiende a medida que avanza la edad.
- La tendencia del consumo es decreciente (Tabla 15).

Tabla 15. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONSUMO DE ALUCINÓGENOS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS (PORCENTAJES), SEGÚN SEXO. ESPAÑA 1994-2006.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856
Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida	6,7	3,6	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7
Edad media al inicio del consumo de alucinógenos (años)	15,4	15,4	15,6	15,6	15,5	15,4	15,6	15,3	15,6	15,4	15,8	15,7	15,5	15,5
Prevalencia de consumo de alucinógenos en últimos 12 meses	5,7	3,1	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6
Prevalencia de consumo de alucinógenos en últimos 30 días	3,6	1,7	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7
Frecuencia de consumo de alucinógenos en últimos 30 días														
Nunca	96,4	98,3	96,2	98,1	97,4	98,5	97,4	98,7	98,2	99,3	97,7	99,3	97,9	99,2
1 a 2 días	2,4	1,2	2,3	1,4	1,7	1,1	1,7	1,1	1,3	0,6	1,5	0,5	1,2	0,5
3 a 5 días	0,7	0,3	0,9	0,2	0,5	0,2	0,6	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1
6 a 9 días	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1
10 a 19 días	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 1994—2006.

4.13 Consumo de heroína

- El consumo de heroína está menos extendido que el de otras drogas ilegales, aunque hay que señalar que las encuestas poblacionales o escolares no son un buen método para estudiar el consumo de esta droga, y generalmente se considera que lo subestiman. En 2006 un 1% de los estudiantes la había consumido heroína alguna vez en la vida, un 0,8% en los últimos 12 meses y un 0,5 % en el último mes (Tabla 16).
- El consumo de los chicos fue muy superior al de las chicas (un 1,2% de los chicos la han consumido en los últimos 12 meses frente a 0,3% de chicas).
- La edad media de inicio en el consumo fue 14,6 años.
- En 2006 se aprecia un ligero aumento del consumo de heroína con respecto a los años precedentes (Tabla 16), que habrá que seguir atentamente en próximas encuestas.

Tabla 16. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONSUMO DE HEROÍNA ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS (PORCENTAJES), SEGÚN SEXO. ESPAÑA 1994-2006.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856
Prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida	0,7	0,3	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5
Edad media al inicio del consumo de heroína (años)	14,4	14,1	14,6	15,1	14,0	15,1	15,5	15,1	14,9	14,8	14,2	15,0	14,5	14,7
Prevalencia de consumo de heroína en últimos 12 meses	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3
Prevalencia de consumo de heroína en últimos 30 días	0,4	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2
Frecuencia de consumo de heroína en últimos 30 días														
Nunca	99,6	99,9	99,6	99,9	99,4	99,8	99,5	99,9	99,7	99,8	99,3	99,9	99,0	99,8
1 a 2 días	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,5	0,1
3 a 5 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
6 a 9 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
10 a 19 días	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
20 a 29 días	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.
FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 1994—2006.

4.14 Consumo de inhalables volátiles

- Bajo esta denominación se incluyen los pegamentos, disolventes, nitritos volátiles, gasolinas e hidrocarburos, etc.
- Su consumo es reducido en esta población. Un 3 % los ha consumido alguna vez en la vida, un 1,8% en los últimos 12 meses y un 1,1 % en el último mes (Tabla 27).
- El consumo es mayoritariamente masculino.
- Es un consumo principalmente esporádico, cuya edad media de inicio se situó en 2006 en los 13,6 años, la más temprana después del tabaco.
- La tendencia del consumo es relativamente estable.

Tabla 17. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONSUMO DE INHALABLES VOLÁTILES ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS (PORCENTAJES), SEGÚN SEXO. ESPAÑA 1994-2006.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856
Prevalencia de consumo de sustancias volátiles alguna vez en la vida	4,1	2,1	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,2	2,0
Edad media al inicio del consumo de de sustancias volátiles (años)	13,8	12,4	13,9	13,3	13,7	13,0	14,0	13,7	14,3	14,2	13,9	14,1	13,8	13,4
Prevalencia de consumo de sustancias volátiles últimos 12 meses	2,5	1,3	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,7	1,1
Prevalencia de consumo de sustancias volátiles en últimos 30 días	1,5	0,8	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6
Frecuencia de consumo de sustancias volátiles en últimos 30 días														
Nunca	98,5	99,2	98,5	99,0	97,8	98,5	98,2	98,9	98,5	99,2	98,4	99,3	98,2	99,4
1 a 2 días	0,8	0,5	0,9	0,8	1,1	1,0	1,3	0,7	1,0	0,5	0,8	0,4	0,8	0,3
3 a 5 días	0,2	0,1	0,3	0,1	0,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
6 a 9 días	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0
10 a 19 días	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,1

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 1994-2006.

4.15 Policonsumo de sustancias psicoactivas

- Los estudiantes que consumen drogas suelen consumir varias sustancias y no una sola. Este hecho lo podemos comprobar en la tabla 18, donde se muestra qué proporción de los que han consumido una determinada droga en los últimos 12 meses ha consumido también otras drogas en el mismo período.
- Un 95,7% de los que han consumido tabaco en los últimos 12 meses han consumido también alcohol en el mismo período, y en un 67,6% cannabis.
- Un 76,8% de los consumidores anuales de cannabis han consumido tabaco en el mismo período, un 97,7% alcohol y un 12,7 % cocaína.
- Entre los que han consumido éxtasis en el último año un 75,5% ha consumido también cocaína, un 58,2% anfetaminas, y un 52,9% alucinógenos. Por lo que respecta a los consumidores anuales de cocaína un 44,3 % ha consumido también éxtasis y un 44,0% alucinógenos.

Tabla 18. PREVALENCIA DE CONSUMO DE DISTINTAS DROGAS PSICOACTIVAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS QUE HAN CONSUMIDO EN EL MISMO PERÍODO CADA UNA DE LAS DROGAS CONSIDERADAS EN LA CABECERA DE CADA COLUMNA (PORCENTAJES), ESPAÑA 2006.

Prevalencia de consumo	Tabaco	Alcohol	Hipnosedantes*	Cannabis	Éxtasis	Alucinógenos	Anfetaminas	Cocaína	Heroína	I. Volátiles	GHB
Tabaco	100	43,4	52,5	76,8	81,3	76,4	78,6	79,6	71,2	65,9	72,1
Alcohol	95,7	100	86,1	97,7	96,8	97,5	98,2	97,5	92,4	94,5	95,4
Hipnosedantes sin receta médica	7,5	5,5	100	8,0	23,8	21,4	19,0	17,5	31,6	26,0	30,0
Cannabis	67,6	38,9	49,8	100	91,4	89,8	90,9	92,7	86,8	75,5	86,0
Éxtasis	5,8	3,1	11,9	7,4	100	45,2	53,5	44,3	72,2	37,6	82,2
Alucinógenos	6,4	3,7	12,5	8,5	52,9	100	48,9	37,1	68,6	41,6	73,8
Anfetaminas	6,1	3,4	10,4	8,0	58,2	45,4	100	44,0	64,6	32,3	74,7
Cocaína	8,5	5,3	14,9	12,7	75,5	53,9	68,8	100	85,0	43,1	83,9
Heroína	1,6	0,9	5,0	2,2	23,1	18,7	19,0	15,9	100	22,4	45,7
Inhalables Volátiles	3,6	2,3	10,0	4,7	28,8	27,2	22,7	19,3	53,7	100	44,1
n	8.984	19.817	1.273	7.894	637	746	693	1.085	203	487	236

FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 1994—2006.

* Tranquilizantes o pastillas para dormir sin receta médica.

4.16 Riesgo percibido por la población ante el consumo drogas

- El riesgo percibido ante distintas conductas de consumo de drogas puede ser un indicador indirecto de la evolución presente o futura de la prevalencia de consumo. Se analiza la proporción de estudiantes que percibe alto riesgo ante determinadas conductas de consumo (% que piensa que una conducta dada puede provocar bastantes o muchos problemas).
- Se asume que conforme aumenta el riesgo percibido ante el consumo de una droga, tiende a disminuir la extensión o la intensidad del consumo.
- En 2006 las conductas de consumo de drogas que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años asociaban a un menor riesgo eran tomar 5 ó 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana, tomar 1 ó 2 cañas/copas diariamente, y tomar tranquilizantes o somníferos esporádicamente. Por el contrario las conductas asociadas a un mayor riesgo eran el consumo habitual (una vez a la semana o más frecuentemente) de heroína, éxtasis o cocaína. También se asociaba a un nivel importante de riesgo el consumo esporádico de estas tres últimas drogas, y en general consumir cualquier droga de comercio ilegal (Tabla 19).

Tabla 19. PERCEPCIÓN DE RIESGO ANTE DISTINTAS CONDUCTAS DE CONSUMO DE DROGAS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14—18 AÑOS, (PORCENTAJE QUE PIENSA QUE ESA CONDUCTA PUEDE CAUSAR BASTANTES O MUCHOS PROBLEMAS), ESPAÑA 2006.

Consumir cannabis esporádicamente	70,2
Consumir tranquilizantes esporádicamente	60,2
Consumir éxtasis esporádicamente	91,3
Consumir cocaína esporádicamente	90,8
Consumir heroína esporádicamente	92,0
Consumir tabaco diariamente (un paquete diario)	87,3
Consumir alcohol (5 ó 6 cañas/copas el fin semana)	51,3
Consumir alcohol (1 ó 2 cañas/copas cada día)	57,4
Consumir cannabis habitualmente	89,0
Consumir tranquilizantes habitualmente	87,5
Consumir éxtasis habitualmente	97,0
Consumir cocaína habitualmente	96,8
Consumir heroína habitualmente	97,0

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

"Esporádicamente": una vez al mes o menos frecuentemente

"Habitualmente": una vez por semana o más frecuentemente

FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2006.

- Con respecto a las diferencias sexuales, se aprecia que en 2006 el riesgo percibido por las mujeres era superior al percibido por los hombres, especialmente para el consumo de alcohol y el consumo de cannabis (Tabla 20).

- Un dato muy positivo de esta encuesta es que aumenta la percepción del riesgo ante el consumo de tabaco, alcohol (tanto en fin de semana como diariamente), y cannabis (Tabla 20).

Tabla 20. EVOLUCIÓN DEL RIESGO PERCIBIDO ASOCIADO AL CONSUMO HABITUAL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14—18 AÑOS, SEGÚN SEXO (PORCENTAJES), ESPAÑA 1994—2006.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Número de encuestados	10.416	10.495	9.174	9.738	8.509	9.503	9.949	10.477	12.795	13.781	12.568	12.953	12.598	13.856
Porcentaje que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas														
Fumar tabaco diario ¹	74,7	79,1	72,8	77,4	75,7	79,9	75,1	79,5	76,7	80,8	78,2	82,3	84,9	89,3
Beber alcohol en fin de semana	39,8	47,7	40,6	49,4	40,3	48,7	41,5	48,3	41,1	48,1	36,8	45,7	48,7	53,6
Consumir alcohol a diario ²	46,3	54,6	43,7	52,9	41,7	49,4	39,4	48,4	38,7	47,9	36,8	45,7	52,3	61,9
Fumar hachís habitualmente	89,8	93,9	84,9	90,2	82,4	88,8	79,4	86,1	77,5	85,4	81,1	86,2	85,7	91,7
Tomar tranquilizantes/somníferos habitualmente	89,9	91,3	87,8	89,4	87,5	89,2	86,9	87,9	88,3	89,1	89,8	89,6	86,1	88,6
Consumir éxtasis habitualmente	96,6	97,9	96,2	97,9	96,3	97,5	95,0	95,9	96,4	97,1	97,1	97,3	95,8	98,0
Consumir cocaína habitualmente	98,1	99,0	96,9	98,3	96,7	98,0	96,3	97,5	96,9	97,8	97,5	98,1	95,6	97,9
Consumir heroína habitualmente	98,4	99,3	97,4	98,8	97,5	98,7	97,6	98,8	98,4	98,8	98,5	99,1	95,8	98,1

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

(¹) Fumar un paquete de tabaco diario

(²) Tomar una o dos caña/copas cada día

"Habitualmente": una vez por semana o más frecuentemente

FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 1994—2006.

4.17 Disponibilidad de drogas percibida por los encuestados

- El grado de facilidad/dificultad para conseguir u obtener las distintas drogas percibido por los encuestados (disponibilidad percibida) puede influir en la probabilidad de consumo de dichas drogas o de que esas drogas generen problemas.
- El indicador utilizado para valorarla es la proporción de estudiantes que piensan que obtener cada droga considerada es relativamente fácil o muy fácil.
- En 2006 las drogas percibidas por los estudiantes como las más disponibles o accesibles eran las de comercio legal y el cannabis. En este sentido, un 91,2% de los estudiantes pensaban que les sería fácil o muy fácil conseguir bebidas alcohólicas si quisieran, un 58,9% tranquilizantes o somníferos, y un 66,8% cannabis (Tabla 21).
- Por lo que respecta a la evolución temporal de la disponibilidad percibida de drogas entre 2004 y 2006 se observa un descenso generalizado de la disponibilidad percibida de todas las drogas. En el caso de algunas drogas, como el cannabis y la cocaína los descensos son muy importantes y aparecen por primera vez tras un ascenso continuado desde 1994. En el caso de otras drogas, como heroína, anfetaminas, éxtasis y alucinógenos continúa la tendencia descendente que ya se manifestaba en 2004. El menor descenso en la disponibilidad percibida afecta al alcohol (Tabla 21).

Tabla 21. EVOLUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PERCIBIDA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ENTRE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS (PORCENTAJES), ESPAÑA 1994-2006.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006
NÚMERO DE ENCUESTADOS	20.789	18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454
PORCENTAJE QUE PIENSA QUE ES FÁCIL/MUY FÁCIL							
Bebidas alcohólicas	93,8	89,0	90,5	91,3	92,0	93,8	91,2
Tranquilizantes / pastillas para dormir	55,9	65,9	65,9	67,2	67,6	67,3	58,9
Hachís/marihuana	30,8	53,9	60,4	59,7	67,9	71,8	66,8
Cocaína	26,7	30,4	37,9	38,0	43,5	46,7	37,4
Heroína	48,0	25,6	29,1	28,1	32,0	30,7	26,1
Anfetaminas	43,9	40,1	39,7	40,2	45,4	41,7	32,1
Éxtasis	46,3	42,6	39,8	43,8	50,0	45,1	31,2
Alucinógenos	26,2	40,1	39,2	41,4	45,3	41,9	33,7
Inhalables volátiles	61,4	54,8	54,2	51,6	54,1	51,1	--

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 1994—2006.

4.18 Información sobre drogas recibida

- Una amplia mayoría de los estudiantes (86,5%) se considera suficiente o perfectamente informado sobre las drogas, sus efectos y los problemas asociados (Tabla 22).
- Las principales vías por las que los estudiantes reciben información son: los padres y hermanos (73,2%), los medios de comunicación (69,3%), y los profesores (63,8%).
- Ha aumentado el porcentaje de estudiantes que han recibido información sobre drogas por parte de sus familias y de los profesores con respecto a años anteriores.
- El 74.2% de los estudiantes declara haber recibido información sobre el consumo de drogas en clase, porcentaje que supera al de años anteriores (en 2002 el 65,6% y en 2004 el 72,5%).

Tabla 22. AUTOVALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE DROGAS POR LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS (%), ESPAÑA, 2006.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006
Perfectamente informado	23,7	33,1	35,5	39,9	45,4	48,4	47,5
Suficientemente informado	44,0	42,8	41,8	42,4	40,5	40,3	39,0
Informado a medias	27,5	20,4	18,9	14,9	12,1	9,8	11,0
Mal informado	4,8	3,8	3,8	2,7	2,0	1,6	2,4

5. CONCLUSIONES

- ❖ En general, el consumo de drogas entre los estudiantes de 14 a 18 años continúa siendo experimental u ocasional, vinculado al ocio y al fin de semana.
- ❖ El alcohol y el tabaco siguen siendo las drogas más consumidas, seguidas del cannabis.
- ❖ Los datos del 2006, muestran sin embargo una evolución muy positiva, con un descenso importante del consumo de las drogas más extendidas entre los estudiantes.
- ❖ Este descenso ha sido especialmente intenso para tabaco, cannabis y cocaína. En el caso de estas dos últimas se ha quebrado la tendencia creciente de los últimos años.
- ❖ En cuanto a las bebidas alcohólicas, ha descendido la proporción de consumidores y la intensidad del consumo con respecto a 2004, aunque las cifras continúan siendo más altas que en 2002.
- ❖ En España los psicoestimulantes tipo éxtasis o anfetaminas y los alucinógenos están menos extendidos que la cocaína (la proporción de consumidores anuales no supera en ninguna de las tres drogas citadas en primer lugar el 3%) y ha seguido una tendencia descendente en los últimos años.

- ❖ Una proporción importante de estudiantes consumen varias drogas, observándose una asociación bastante estrecha entre el consumo de alcohol, tabaco y cannabis, por una parte, y entre el de estimulantes (cocaína, éxtasis, o anfetaminas) y alucinógenos, por otra.
- ❖ Otro dato positivo de esta encuesta, y que podría haber influido en el descenso del consumo, es el aumento de la percepción de riesgo ante el consumo de tabaco, alcohol o cannabis.
- ❖ Finalmente, también es muy positiva la importante disminución de la percepción de disponibilidad de todas las drogas por parte de los estudiantes, algo que ocurre por primera vez desde hace varios años, y que podría haber repercutido también en el descenso del consumo.